

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

1- ROTAB : Boigneville
P234 - comp
Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	25	
Gaillet	25	
Mouron	24	
Paturin	17	
Renouée liseron	13	

Situation initiale :

Année 1 - Luzerne

Date de semis Non définie Chénopode 0 Gaillet 0 Mouron 0 Paturin 0 Renouée liseron 0	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Chénopode 0 Gaillet 0 Mouron 0 Paturin 0 Renouée liseron 0	Interculture Chénopode 0 Gaillet 0 Mouron 0 Paturin 0 Renouée liseron 0	Date de labour Non définie Chénopode 0 Gaillet 0 Mouron 0 Paturin 0 Renouée liseron 0	Densité de semis 12 gr/m² Chénopode 0 Gaillet 0 Mouron 0 Paturin 0 Renouée liseron 0
Entre rangs 42 cm Chénopode 0 Gaillet 0 Mouron 0 Paturin 0 Renouée liseron 0	Variété Non couvrante Chénopode 0 Gaillet 0 Mouron 0 Paturin 0 Renouée liseron 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Gaillet 0 Mouron 0 Paturin 0 Renouée liseron 0	Désherbage chimique 	Score annuel Chénopode 0 Gaillet 0 Mouron 0 Paturin 0 Renouée liseron 0

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50% Sep-d3 50%	Nov-d1	12 gr/m²
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet -6	Gaillet -8	Gaillet 0
Mouron 2	Mouron -4	Mouron 0	Mouron -1	Mouron 0
Paturin 17	Paturin -4	Paturin -3	Paturin -1	Paturin 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mar-d2 Mar-d3 Avr-d2 Houe rotative : Herse étrille : Mar-d1		Chénopode 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -11		Gaillet 64
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -2		Mouron 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron -8		Paturin 2
Paturin 0	Paturin 0	Paturin -6		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -7		

Année 3 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Mar-d2 50% Aoû-d3 50% Sep-d1 50% Mar-d3 50%	Déc-d1	12 gr/m²
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -9	Chénopode -1	Chénopode 0
Gaillet 4	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -7	Gaillet 0
Mouron 70	Mouron 0	Mouron -5	Mouron -1	Mouron 0
Paturin 38	Paturin 0	Paturin -7	Paturin -1	Paturin 0
Renouée liseron 85	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d1 Mai-d2 Jun-d1 Jun-d2 Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 46
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -9		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Mouron 47
Mouron 0	Mouron 0	Mouron -17		Paturin 22
Paturin 0	Paturin 0	Paturin -8		Renouée liseron 57
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -23		

Année 4 - Féverole d'hiver

Date de semis

Nov-d1

Chénopode	0
Gaillet	82
Mouron	0
Paturin	13
Renouée liseron	0

Étouffement culture

Association de cultures :
Très faible

Chénopode	0
Gaillet	0
Mouron	0
Paturin	0
Renouée liseron	0

Interculture

Oct-d1 50%

Sep-d1 50%

Chénopode	-3
Gaillet	-4
Mouron	-1
Paturin	-3
Renouée liseron	0

Date de labour

Nov-d1

Chénopode	-1
Gaillet	-8
Mouron	-1
Paturin	-1
Renouée liseron	-3

Densité de semis

12 gr/m²

Chénopode	0
Gaillet	0
Mouron	0
Paturin	0
Renouée liseron	0

Entre rangs

42 cm

Chénopode	0
Gaillet	0
Mouron	0
Paturin	0
Renouée liseron	0

Variété

Non couvrante

Chénopode	0
Gaillet	0
Mouron	0
Paturin	0
Renouée liseron	0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Mar-d3

Avr-d1

Houe rotative :

Herse étrille :

Chénopode	-6
Gaillet	-0
Mouron	-5
Paturin	-3
Renouée liseron	-5

Désherbage chimique

Score annuel

Chénopode	0
Gaillet	69
Mouron	0
Paturin	5
Renouée liseron	0