

Exploitation : CUVILLIER  
Parcelle : Clement  
Type de sol : limon argileux

Commentaires :

  

### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	21	
Renouée liseron	40	
Chénopode	52	
Laiteron rude	57	
Arroche	62	

### Situation initiale :

#### Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Pas de labour	180 gr/m²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Laiteron rude 29	Laiteron rude -4	Laiteron rude -1	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Arroche 12	Arroche -4	Arroche 0	Arroche 0	Arroche 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2   Mai-d2   Nov-d2	Vulpin 49
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Chénopode 4
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Laiteron rude 22
Laiteron rude -2	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Arroche 6
Arroche -2	Arroche 0	Arroche 0		

## Année 2 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50% Mar-d2 50%	Nov-d3	12 gr/m²
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin -9	Vulpin -9	Vulpin 0
Renouée liseron 58	Renouée liseron 0	Renouée liseron -1	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode -8	Chénopode -2	Chénopode 0
Laiteron rude 38	Laiteron rude 0	Laiteron rude -4	Laiteron rude -3	Laiteron rude 0
Arroche 118	Arroche 0	Arroche -9	Arroche -3	Arroche 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2	Mai-d1 Avr-d1	Vulpin 19
Vulpin 0	Vulpin 0	Houe rotative : Herse étrille :		Renouée liseron 44
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Vulpin -1		Chénopode 51
Chénopode 0	Chénopode 0	Renouée liseron -7		Laiteron rude 28
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Chénopode -3		Arroche 103
Arroche 0	Arroche 0	Laiteron rude -3		
		Arroche -4		

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible		Pas de labour	210 gr/m²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Laiteron rude 29	Laiteron rude -4	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Arroche 12	Arroche -4	Arroche 0	Arroche 0	Arroche 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2 Mai-d2 Nov-d2	Vulpin 54
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Chénopode 5
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Laiteron rude 23
Laiteron rude -2	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Arroche 6
Arroche -2	Arroche 0	Arroche 0		

## Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d2</div> <div>Vulpin 21</div> <div>Renouée liseron 134</div> <div>Chénopode 68</div> <div>Laiteron rude 64</div> <div>Arroche 100</div>	<div>Association de cultures : Très faible</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Arroche 0</div>	<div>Sep-d2 50% Avr-d2 50%</div> <div>Mar-d3 50% Août-d2 50%</div> <div>Vulpin -10</div> <div>Renouée liseron -7</div> <div>Chénopode -10</div> <div>Laiteron rude -6</div> <div>Arroche -12</div>	<div>Nov-d3</div> <div>Vulpin -9</div> <div>Renouée liseron -6</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Laiteron rude -3</div> <div>Arroche -3</div>	<div>12 gr/m²</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Arroche 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>42 cm</div> <div>Vulpin -2</div> <div>Renouée liseron -2</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Laiteron rude -2</div> <div>Arroche -2</div>	<div>Non couvrante</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Arroche 0</div>	<div>Bineuse : Jun-d1 Mai-d2</div> <div>Houe rotative :</div> <div>Herse étrille :</div> <div>Vulpin -1</div> <div>Renouée liseron -12</div> <div>Chénopode -5</div> <div>Laiteron rude -6</div> <div>Arroche -5</div>	<div>Avr-d2</div>	<div>Vulpin 0</div> <div>Renouée liseron 107</div> <div>Chénopode 49</div> <div>Laiteron rude 48</div> <div>Arroche 78</div>

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Oct-d2</div> <div>Vulpin 60</div> <div>Renouée liseron 1</div> <div>Chénopode 11</div> <div>Laiteron rude 29</div> <div>Arroche 12</div>	<div>Association de cultures : Faible</div> <div>Vulpin -4</div> <div>Renouée liseron -4</div> <div>Chénopode -4</div> <div>Laiteron rude -4</div> <div>Arroche -4</div>	<div>Vulpin 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Arroche 0</div>	<div>Oct-d2</div> <div>Vulpin -16</div> <div>Renouée liseron -6</div> <div>Chénopode -3</div> <div>Laiteron rude -3</div> <div>Arroche -3</div>	<div>200 gr/m²</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Arroche 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>12.5 cm</div> <div>Vulpin -2</div> <div>Renouée liseron -2</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Laiteron rude -2</div> <div>Arroche -2</div>	<div>Non couvrante</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Arroche 0</div>	<div>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Arroche 0</div>	<div>Nov-d2 Mai-d2 Mar-d2</div>	<div>Vulpin 38</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Chénopode 2</div> <div>Laiteron rude 20</div> <div>Arroche 3</div>

## Année 6 - Pomme de terre

### Date de semis

Avr-d2

Vulpin	21
Renouée liseron	127
Chénopode	63
Laiteron rude	57
Arroche	99

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Très faible

Vulpin	0
Renouée liseron	0
Chénopode	0
Laiteron rude	0
Arroche	0

### Interculture

Avr-d2 50%    Nov-d3 50%  
Mar-d3 50%    Sep-d2 50%  
Août-d2 50%

Vulpin	-10
Renouée liseron	-7
Chénopode	-10
Laiteron rude	-7
Arroche	-12

### Date de labour

Pas de labour

Vulpin	0
Renouée liseron	0
Chénopode	0
Laiteron rude	0
Arroche	0

### Densité de semis

12 gr/m²

Vulpin	0
Renouée liseron	0
Chénopode	0
Laiteron rude	0
Arroche	0

### Entre rangs

42 cm

Vulpin	0
Renouée liseron	0
Chénopode	0
Laiteron rude	0
Arroche	0

### Variété

Non couvrante

Vulpin	0
Renouée liseron	0
Chénopode	0
Laiteron rude	0
Arroche	0

### Désherbage mécanique

Bineuse :  
Houe rotative :  
Herse étrille :

Vulpin	0
Renouée liseron	0
Chénopode	0
Laiteron rude	0
Arroche	0

### Désherbage chimique

Jun-d1

### Score annuel

Vulpin	11
Renouée liseron	120
Chénopode	53
Laiteron rude	51
Arroche	87