

Scénario : alternative  
 Exploitation : Non renseigné  
 Parcelle : test lolo  
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

  


**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :	
Chénopode	26 ( 26)	
Laiteron rude	42 ( 45)	
Ravenelle	44 ( 49)	

**Scénario :**

**Année 1 - Féverole d'hiver**

<p><b>Date de semis</b></p> <p>Nov-d3</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Laiteron rude 16</p> <p>Ravenelle 17</p>	<p><b>Étouffement culture</b></p> <p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Ravenelle 0</p>	<p><b>Interculture</b></p> <p>Oct-d2 50% Oct-d1 50%</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Laiteron rude -3</p> <p>Ravenelle -4</p>	<p><b>Date de labour</b></p> <p>Nov-d2</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Laiteron rude -2</p> <p>Ravenelle -2</p>	<p><b>Densité de semis</b></p> <p>12 gr/m<sup>2</sup></p> <p>Chénopode 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Ravenelle 0</p>
<p><b>Entre rangs</b></p> <p>42 cm</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Ravenelle 0</p>	<p><b>Variété</b></p> <p>Non couvrante</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Ravenelle 0</p>	<p><b>Désherbage mécanique</b></p> <p>Bineuse : Mai-d3</p> <p>Houe rotative : Mar-d2</p> <p>Chénopode -5</p> <p>Laiteron rude -4</p> <p>Ravenelle -4</p>	<p><b>Désherbage chimique</b></p>	<p><b>Score annuel</b></p> <p>Chénopode 0</p> <p>Laiteron rude 8</p> <p>Ravenelle 7</p>

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d1 50%    Sep-d3 50%	Nov-d1	350 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Laiteron rude 26	Laiteron rude -4	Laiteron rude -2	Laiteron rude -2	Laiteron rude 0
Ravenelle 37	Ravenelle -4	Ravenelle -3	Ravenelle -2	Ravenelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 0
Chénopode -1	Chénopode -1	Mar-d1		Laiteron rude 15
Laiteron rude -1	Laiteron rude -1	Chénopode -2		Ravenelle 26
Ravenelle -1	Ravenelle -1	Laiteron rude -1		
		Ravenelle -1		

## Année 3 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Mar-d3 50%    Avr-d2 50%	Avr-d1	12 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 57	Chénopode 0	Chénopode -7	Chénopode -2	Chénopode 0
Laiteron rude 61	Laiteron rude 0	Laiteron rude -4	Laiteron rude -2	Laiteron rude 0
Ravenelle 56	Ravenelle 0	Ravenelle -5	Ravenelle -2	Ravenelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 40
Chénopode 0	Chénopode 0	Mai-d3		Laiteron rude 46
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Mai-d2    Mai-d1		Ravenelle 40
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Chénopode -8		
		Laiteron rude -9		
		Ravenelle -8		