

Exploitation : EPL
Parcelle : tilloy
Type de sol : limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Agrostis	22	
Matricaire	65	
Ray-grass	19	
Renouée liseron	33	
Brome stérile	6	

Situation initiale :

Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50% Aoû-d2 50%	Déc-d2	12 gr/m²
Agrostis 17	Agrostis 0	Agrostis -0	Agrostis -6	Agrostis 0
Matricaire 48	Matricaire 0	Matricaire -4	Matricaire -2	Matricaire 0
Ray-grass 35	Ray-grass 0	Ray-grass -12	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Renouée liseron 58	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Brome stérile 16	Brome stérile 0	Brome stérile -11	Brome stérile -11	Brome stérile 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille : Mai-d1	Avr-d3 Avr-d1 Mai-d2	
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 11
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -4		Matricaire 38
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -1		Ray-grass 16
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -13		Renouée liseron 39
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile -1		Brome stérile 0

Année 2 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible		Déc-d2	12 gr/m²
Agrostis 1	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis -6	Agrostis 0
Matricaire 42	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire 0
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Renouée liseron 127	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Brome stérile 11	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile -11	Brome stérile 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mai-d1		
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 0
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -2		Matricaire 38
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -1		Ray-grass 12
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -7		Renouée liseron 113
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile -1		Brome stérile 0

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible		Pas de labour	205 gr/m²
Agrostis 46	Agrostis -4	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0
Matricaire 23	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Brome stérile 21	Brome stérile -4	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2 Mai-d2	
Agrostis -2	Agrostis -1	Agrostis 0		Agrostis 39
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0		Matricaire 16
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 11
Renouée liseron -2	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Brome stérile -2	Brome stérile -1	Brome stérile 0		Brome stérile 14

Année 4 - Pois de printemps

Date de semis <div>Mar-d3</div> <div>Agrostis 9</div> <div>Matricaire 47</div> <div>Ray-grass 33</div> <div>Renouée liseron 85</div> <div>Brome stérile 15</div>	Étouffement culture Association de cultures : Très faible <div>Agrostis 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Brome stérile 0</div>	Interculture <div>Aoû-d2 50%</div> <div>Sep-d1 50%</div> <div>Aoû-d3 50%</div> <div>Agrostis -0</div> <div>Matricaire -4</div> <div>Ray-grass -12</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Brome stérile -11</div>	Date de labour <div>Déc-d2</div> <div>Agrostis -6</div> <div>Matricaire -2</div> <div>Ray-grass -6</div> <div>Renouée liseron -6</div> <div>Brome stérile -11</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Agrostis 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Brome stérile 0</div>
Entre rangs 42 cm <div>Agrostis 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Brome stérile 0</div>	Variété Non couvrante <div>Agrostis 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Brome stérile 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Avr-d1</div> <div>Agrostis -0</div> <div>Matricaire -2</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Renouée liseron -3</div> <div>Brome stérile -1</div>	Désherbage chimique <div>Mar-d3</div>	Score annuel <div>Agrostis 3</div> <div>Matricaire 39</div> <div>Ray-grass 12</div> <div>Renouée liseron 76</div> <div>Brome stérile 0</div>

Année 5 - Colza d'hiver

Date de semis <div>Aoû-d3</div> <div>Agrostis 8</div> <div>Matricaire 30</div> <div>Ray-grass 96</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Brome stérile 105</div>	Étouffement culture Association de cultures : Moyen <div>Agrostis -6</div> <div>Matricaire -6</div> <div>Ray-grass -6</div> <div>Renouée liseron -6</div> <div>Brome stérile -6</div>	Interculture <div>Aoû-d1 50%</div> <div>Agrostis 0</div> <div>Matricaire -1</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Brome stérile -2</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Agrostis 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Brome stérile 0</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Agrostis 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Brome stérile 0</div>
Entre rangs 45 cm <div>Agrostis 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Brome stérile 0</div>	Variété Non couvrante <div>Agrostis 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Brome stérile 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : <div>Oct-d2</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Agrostis -1</div> <div>Matricaire -1</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Brome stérile -6</div>	Désherbage chimique <div>Aoû-d3</div>	Score annuel <div>Agrostis 1</div> <div>Matricaire 22</div> <div>Ray-grass 84</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Brome stérile 92</div>

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis

Nov-d1

Agrostis	46
Matricaire	23
Ray-grass	18
Renouée liseron	1
Brome stérile	21

Étouffement culture

Association de cultures :
Faible

Agrostis	-4
Matricaire	-4
Ray-grass	-4
Renouée liseron	-4
Brome stérile	-4

Interculture

Août-d2 50% Août-d3 50%

Agrostis	0
Matricaire	-3
Ray-grass	-7
Renouée liseron	0
Brome stérile	-6

Date de labour

Pas de labour

Agrostis	0
Matricaire	0
Ray-grass	0
Renouée liseron	0
Brome stérile	0

Densité de semis

205 gr/m²

Agrostis	0
Matricaire	0
Ray-grass	0
Renouée liseron	0
Brome stérile	0

Entre rangs

12.5 cm

Agrostis	-2
Matricaire	-2
Ray-grass	-2
Renouée liseron	-2
Brome stérile	-2

Variété

Moyennement couvrante

Agrostis	-1
Matricaire	-1
Ray-grass	-1
Renouée liseron	-1
Brome stérile	-1

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Agrostis	0
Matricaire	0
Ray-grass	0
Renouée liseron	0
Brome stérile	0

Désherbage chimique

Mar-d2 Mai-d2

Score annuel

Agrostis	39
Matricaire	13
Ray-grass	4
Renouée liseron	0
Brome stérile	8