

Scénario : reconception
 Exploitation : EPL
 Parcelle : tilloy
 Type de sol : limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|-----------------|-----------|
| Agrostis | 24 (22) |
| Matricaire | 66 (65) |
| Ray-grass | 21 (19) |
| Renouée liseron | 31 (33) |
| Brome stérile | 7 (6) |

Scénario :

Année 1 - Betteraves

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|--------------------|--|--|----------------------------|----------------------|
| Mar-d2 | Association de cultures : Très faible | Sep-d1 50% Aoû-d2 50% Aoû-d3 50% | Pas de labour | 12 gr/m ² |
| Agrostis 17 | Agrostis 0 | Agrostis -0 | Agrostis 0 | Agrostis 0 |
| Matricaire 48 | Matricaire 0 | Matricaire -4 | Matricaire 0 | Matricaire 0 |
| Ray-grass 35 | Ray-grass 0 | Ray-grass -12 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Renouée liseron 58 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 |
| Brome stérile 16 | Brome stérile 0 | Brome stérile -11 | Brome stérile 0 | Brome stérile 0 |
| Entre rangs | | | | |
| 42 cm | Non couvrante | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| Agrostis 0 | Agrostis 0 | Bineuse : Mai-d3 | Mai-d2 Avr-d1 Avr-d3 | Agrostis 16 |
| Matricaire 0 | Matricaire 0 | Houe rotative : Herse étrille : Mai-d1 | | Matricaire 40 |
| Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Agrostis 0 | | Ray-grass 22 |
| Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Matricaire -4 | | Renouée liseron 45 |
| Brome stérile 0 | Brome stérile 0 | Ray-grass -1 | | Brome stérile 4 |
| | | Renouée liseron -13 | | |
| | | Brome stérile -1 | | |

Année 2 - Pomme de terre

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------------|--|---|---------------------|----------------------|
| Avr-d2 | Association de cultures : Très faible | Mar-d2 50% Aoû-d1 50% | Déc-d2 | 12 gr/m ² |
| Agrostis 1 | Agrostis 0 | Agrostis -1 | Agrostis -6 | Agrostis 0 |
| Matricaire 42 | Matricaire 0 | Matricaire -4 | Matricaire -2 | Matricaire 0 |
| Ray-grass 19 | Ray-grass 0 | Ray-grass -4 | Ray-grass -6 | Ray-grass 0 |
| Renouée liseron 127 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron -1 | Renouée liseron -6 | Renouée liseron 0 |
| Brome stérile 11 | Brome stérile 0 | Brome stérile -2 | Brome stérile -11 | Brome stérile 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mai-d1 | | |
| Agrostis 0 | Agrostis 0 | Agrostis 0 | | Agrostis 0 |
| Matricaire 0 | Matricaire 0 | Matricaire -2 | | Matricaire 34 |
| Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass -1 | | Ray-grass 9 |
| Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron -7 | | Renouée liseron 112 |
| Brome stérile 0 | Brome stérile 0 | Brome stérile -1 | | Brome stérile 0 |

Année 3 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|--------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-----------------------|
| Nov-d1 | Association de cultures : Faible | Agrostis 0 | Pas de labour | 205 gr/m ² |
| Agrostis 46 | Agrostis -4 | Matricaire 0 | Agrostis 0 | Agrostis 0 |
| Matricaire 23 | Matricaire -4 | Ray-grass 0 | Matricaire 0 | Matricaire 0 |
| Ray-grass 18 | Ray-grass -4 | Renouée liseron 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Renouée liseron 1 | Renouée liseron -4 | Brome stérile 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 |
| Brome stérile 21 | Brome stérile -4 | | Brome stérile 0 | Brome stérile 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 12.5 cm | Moyennement couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mai-d2 Mar-d2 | | |
| Agrostis -2 | Agrostis -1 | Agrostis 0 | | Agrostis 39 |
| Matricaire -2 | Matricaire -1 | Matricaire 0 | | Matricaire 16 |
| Ray-grass -2 | Ray-grass -1 | Ray-grass 0 | | Ray-grass 11 |
| Renouée liseron -2 | Renouée liseron -1 | Renouée liseron 0 | | Renouée liseron 0 |
| Brome stérile -2 | Brome stérile -1 | Brome stérile 0 | | Brome stérile 14 |

Année 4 - Colza d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|--|---------------------------------|---|---|--|
| Aoû-d3 | Association de cultures : Moyen | Aoû-d2 50% | Pas de labour | 12 gr/m ² |
| Agrostis 8 | Agrostis -6 | Agrostis 0 | Agrostis 0 | Agrostis 0 |
| Matricaire 30 | Matricaire -6 | Matricaire -1 | Matricaire 0 | Matricaire 0 |
| Ray-grass 96 | Ray-grass -6 | Ray-grass -3 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Renouée liseron 0 | Renouée liseron -6 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 |
| Brome stérile 105 | Brome stérile -6 | Brome stérile -3 | Brome stérile 0 | Brome stérile 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 45 cm | Non couvrante | Bineuse : Oct-d2 Houe rotative : Herse étrille : | Aoû-d3 | Agrostis 1 Matricaire 21 Ray-grass 83 Renouée liseron 0 Brome stérile 91 |
| Agrostis 0 | Agrostis 0 | Agrostis -1 | | |
| Matricaire 0 | Matricaire 0 | Matricaire -1 | | |
| Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass -4 | | |
| Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | | |
| Brome stérile 0 | Brome stérile 0 | Brome stérile -6 | | |

Année 5 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|--|----------------------------------|---|---|--|
| Nov-d1 | Association de cultures : Faible | Aoû-d3 50% Aoû-d2 50% | Pas de labour | 205 gr/m ² |
| Agrostis 46 | Agrostis -4 | Agrostis 0 | Agrostis 0 | Agrostis 0 |
| Matricaire 23 | Matricaire -4 | Matricaire -3 | Matricaire 0 | Matricaire 0 |
| Ray-grass 18 | Ray-grass -4 | Ray-grass -7 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Renouée liseron 1 | Renouée liseron -4 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 |
| Brome stérile 21 | Brome stérile -4 | Brome stérile -6 | Brome stérile 0 | Brome stérile 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 45 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Mai-d2 Mar-d2 | Agrostis 42 Matricaire 16 Ray-grass 7 Renouée liseron 0 Brome stérile 11 |
| Agrostis 0 | Agrostis 0 | Agrostis 0 | | |
| Matricaire 0 | Matricaire 0 | Matricaire 0 | | |
| Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | |
| Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | | |
| Brome stérile 0 | Brome stérile 0 | Brome stérile 0 | | |

Année 6 - Lin de printemps

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|--------------------|--|---|---------------------|-----------------------|
| Mar-d2 | Association de cultures : Très faible | Aoû-d2 50% Sep-d1 50% Aoû-d3 50% | Déc-d2 | 205 gr/m ² |
| Agrostis 17 | Agrostis 0 | Agrostis -0 | Agrostis -6 | Agrostis 0 |
| Matricaire 48 | Matricaire 0 | Matricaire -4 | Matricaire -2 | Matricaire 0 |
| Ray-grass 35 | Ray-grass 0 | Ray-grass -12 | Ray-grass -6 | Ray-grass 0 |
| Renouée liseron 58 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron -6 | Renouée liseron 0 |
| Brome stérile 16 | Brome stérile 0 | Brome stérile -11 | Brome stérile -11 | Brome stérile 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 12.5 cm | Moyennement couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Avr-d1 Mar-d2 | Agrostis 10 |
| Agrostis 0 | Agrostis -1 | Agrostis 0 | Matricaire 41 | Matricaire 41 |
| Matricaire 0 | Matricaire -1 | Matricaire 0 | Ray-grass 15 | Ray-grass 15 |
| Ray-grass 0 | Ray-grass -1 | Ray-grass 0 | Renouée liseron 51 | Renouée liseron 51 |
| Renouée liseron 0 | Renouée liseron -1 | Renouée liseron 0 | Brome stérile 0 | Brome stérile 0 |
| Brome stérile 0 | Brome stérile -1 | Brome stérile 0 | | |