

Scénario : allongement de la rotation
 Exploitation : EPL
 Parcelle : tilloy
 Type de sol : limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Agrostis	27 (22)
Matricaire	64 (65)
Ray-grass	17 (19)
Renouée liseron	27 (33)
Brome stérile	5 (6)

Scénario :
Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50% Sep-d1 50% Aoû-d2 50%	Déc-d2	12 gr/m ²
Agrostis 17	Agrostis 0	Agrostis -0	Agrostis -6	Agrostis 0
Matricaire 48	Matricaire 0	Matricaire -4	Matricaire -2	Matricaire 0
Ray-grass 35	Ray-grass 0	Ray-grass -12	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Renouée liseron 58	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Brome stérile 16	Brome stérile 0	Brome stérile -11	Brome stérile -11	Brome stérile 0
Entre rangs				
42 cm	Non couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Agrostis 0	Agrostis 0	Bineuse : Mai-d3	Avr-d1 Mai-d2 Avr-d3	Agrostis 11
Matricaire 0	Matricaire 0	Houe rotative : Herse étrille : Mai-d1		Matricaire 38
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Agrostis 0		Ray-grass 16
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Matricaire -4		Renouée liseron 39
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Ray-grass -1		Brome stérile 0
		Renouée liseron -13		
		Brome stérile -1		

Année 2 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Agrostis 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Brome stérile 0	Déc-d2	12 gr/m ² Agrostis 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Brome stérile 0
Agrostis 1 Matricaire 42 Ray-grass 19 Renouée liseron 127 Brome stérile 11	Agrostis 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Brome stérile 0	Agrostis 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Brome stérile 0	Agrostis -6 Matricaire -2 Ray-grass -6 Renouée liseron -6 Brome stérile -11	Agrostis 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Brome stérile 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mai-d1		Agrostis 0 Matricaire 38 Ray-grass 12 Renouée liseron 113 Brome stérile 0
Agrostis 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Brome stérile 0	Agrostis 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Brome stérile 0	Agrostis 0 Matricaire -2 Ray-grass -1 Renouée liseron -7 Brome stérile -1		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Agrostis 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Brome stérile 0	Pas de labour	205 gr/m ² Agrostis 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Brome stérile 0
Agrostis 46 Matricaire 23 Ray-grass 18 Renouée liseron 1 Brome stérile 21	Agrostis -4 Matricaire -4 Ray-grass -4 Renouée liseron -4 Brome stérile -4	Agrostis 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Brome stérile 0	Agrostis 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Brome stérile 0	Agrostis 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Brome stérile 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mai-d2 Mar-d2		Agrostis 39 Matricaire 16 Ray-grass 11 Renouée liseron 0 Brome stérile 14
Agrostis -2 Matricaire -2 Ray-grass -2 Renouée liseron -2 Brome stérile -2	Agrostis -1 Matricaire -1 Ray-grass -1 Renouée liseron -1 Brome stérile -1	Agrostis 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Brome stérile 0		

Année 4 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Aoû-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Agrostis 8	Agrostis -6	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0
Matricaire 30	Matricaire -6	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Brome stérile 105	Brome stérile -6	Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Oct-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Aoû-d3	Agrostis 1 Matricaire 22 Ray-grass 84 Renouée liseron 0 Brome stérile 92
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis -1		
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -1		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -4		
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile -6		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50% Aoû-d3 50%	Pas de labour	205 gr/m ²
Agrostis 46	Agrostis -4	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0
Matricaire 23	Matricaire -4	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -7	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Brome stérile 21	Brome stérile -4	Brome stérile -6	Brome stérile 0	Brome stérile 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2 Mar-d2	Agrostis 40 Matricaire 14 Ray-grass 5 Renouée liseron 0 Brome stérile 9
Agrostis -2	Agrostis 0	Agrostis 0		
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0		

Année 6 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50% Sep-d1 50% Aoû-d3 50%	Déc-d2	205 gr/m ²
Agrostis 17	Agrostis 0	Agrostis -0	Agrostis -6	Agrostis 0
Matricaire 48	Matricaire 0	Matricaire -4	Matricaire -2	Matricaire 0
Ray-grass 35	Ray-grass 0	Ray-grass -12	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Renouée liseron 58	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Brome stérile 16	Brome stérile 0	Brome stérile -11	Brome stérile -11	Brome stérile 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mai-d1	Mar-d2	Agrostis 10 Matricaire 41 Ray-grass 15 Renouée liseron 51 Brome stérile 0
Agrostis 0	Agrostis -1	Agrostis 0		
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0		
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Renouée liseron 0	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		
Brome stérile 0	Brome stérile -1	Brome stérile 0		

Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50% Aoû-d2 50%	Pas de labour	205 gr/m ²
Agrostis 46	Agrostis -4	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0
Matricaire 23	Matricaire -4	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -7	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Brome stérile 21	Brome stérile -4	Brome stérile -6	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mai-d2 Mar-d2		Agrostis 40 Matricaire 14 Ray-grass 5 Renouée liseron 0 Brome stérile 9
Agrostis -2	Agrostis 0	Agrostis 0		
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0		