

Exploitation : LEBLEU
Parcelle : Olivier
Type de sol : Argile

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	14	
Renouée liseron	49	
Laiteron rude	66	
Chénopode	55	
Véronique de perse	68	

Situation initiale :

Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Mar-d3</p> <p>Vulpin 35</p> <p>Renouée liseron 85</p> <p>Laiteron rude 46</p> <p>Chénopode 66</p> <p>Véronique de perse 37</p>	<p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>	<p>Août-d2 50%</p> <p>Sep-d1 50%</p> <p>Vulpin -5</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Laiteron rude -2</p> <p>Chénopode -3</p> <p>Véronique de perse -3</p>	<p>Nov-d1</p> <p>Vulpin -5</p> <p>Renouée liseron -3</p> <p>Laiteron rude -2</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Véronique de perse -2</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>42 cm</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>	<p>Mai-d1 Mai-d3 Mai-d2</p> <p>Mar-d2 Avr-d3</p>	<p>Vulpin 25</p> <p>Renouée liseron 82</p> <p>Laiteron rude 43</p> <p>Chénopode 62</p> <p>Véronique de perse 32</p>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible		Oct-d3	360 gr/m²
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -7	Vulpin -2
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron -2
Laiteron rude 28	Laiteron rude -4	Laiteron rude 0	Laiteron rude -2	Laiteron rude -2
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode -2
Véronique de perse 33	Véronique de perse -4	Véronique de perse 0	Véronique de perse -2	Véronique de perse -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2 Mai-d2	Vulpin 21
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Laiteron rude 19
Laiteron rude -1	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Chénopode 0
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Véronique de perse 24
Véronique de perse -1	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		

Année 3 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Août-d2 50% Sep-d1 50%	Nov-d1	12 gr/m²
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -5	Vulpin 0
Renouée liseron 133	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Laiteron rude 61	Laiteron rude 0	Laiteron rude -2	Laiteron rude -2	Laiteron rude 0
Chénopode 57	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Véronique de perse 46	Véronique de perse 0	Véronique de perse -3	Véronique de perse -2	Véronique de perse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3	Vulpin 5
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Renouée liseron 129
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Laiteron rude 57
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Chénopode 52
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Véronique de perse 41
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d3</div> <div>Vulpin 35</div> <div>Renouée liseron 1</div> <div>Laiteron rude 28</div> <div>Chénopode 8</div> <div>Véronique de perse 33</div>	Étouffement culture Association de cultures : Faible <div>Vulpin -4</div> <div>Renouée liseron -4</div> <div>Laiteron rude -4</div> <div>Chénopode -4</div> <div>Véronique de perse -4</div>	Interculture <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Véronique de perse 0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Véronique de perse 0</div>	Densité de semis 360 gr/m² <div>Vulpin -2</div> <div>Renouée liseron -2</div> <div>Laiteron rude -2</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Véronique de perse -2</div>
Entre rangs 15 cm <div>Vulpin -1</div> <div>Renouée liseron -1</div> <div>Laiteron rude -1</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Véronique de perse -1</div>	Variété Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Véronique de perse 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Véronique de perse 0</div>	Désherbage chimique <div>Mai-d2</div> <div>Mar-d2</div>	Score annuel <div>Vulpin 28</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Laiteron rude 21</div> <div>Chénopode 1</div> <div>Véronique de perse 26</div>

Année 5 - Pois de printemps

Date de semis <div>Avr-d3</div> <div>Vulpin 15</div> <div>Renouée liseron 133</div> <div>Laiteron rude 61</div> <div>Chénopode 57</div> <div>Véronique de perse 46</div>	Étouffement culture Association de cultures : Très faible <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Véronique de perse 0</div>	Interculture <div>Sep-d1 50%</div> <div>Aoû-d2 50%</div> <div>Vulpin -5</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Laiteron rude -2</div> <div>Chénopode -3</div> <div>Véronique de perse -3</div>	Date de labour <div>Nov-d1</div> <div>Vulpin -5</div> <div>Renouée liseron -3</div> <div>Laiteron rude -2</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Véronique de perse -2</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Véronique de perse 0</div>
Entre rangs 42 cm <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Véronique de perse 0</div>	Variété Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Véronique de perse 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Véronique de perse 0</div>	Désherbage chimique <div>Avr-d3</div> <div>Avr-d2</div>	Score annuel <div>Vulpin 5</div> <div>Renouée liseron 129</div> <div>Laiteron rude 57</div> <div>Chénopode 52</div> <div>Véronique de perse 41</div>

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis

Oct-d3

Vulpin	35
Renouée liseron	1
Laiteron rude	28
Chénopode	8
Véronique de perse	33

Étouffement culture

Association de cultures :
Faible

Vulpin	-4
Renouée liseron	-4
Laiteron rude	-4
Chénopode	-4
Véronique de perse	-4

Interculture

Vulpin	0
Renouée liseron	0
Laiteron rude	0
Chénopode	0
Véronique de perse	0

Date de labour

Nov-d1

Vulpin	-5
Renouée liseron	-3
Laiteron rude	-2
Chénopode	-1
Véronique de perse	-2

Densité de semis

360 gr/m²

Vulpin	-2
Renouée liseron	-2
Laiteron rude	-2
Chénopode	-2
Véronique de perse	-2

Entre rangs

15 cm

Vulpin	-1
Renouée liseron	-1
Laiteron rude	-1
Chénopode	-1
Véronique de perse	-1

Variété

Non couvrante

Vulpin	0
Renouée liseron	0
Laiteron rude	0
Chénopode	0
Véronique de perse	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Vulpin	0
Renouée liseron	0
Laiteron rude	0
Chénopode	0
Véronique de perse	0

Désherbage chimique

Mar-d2 Mai-d2

Score annuel

Vulpin	23
Renouée liseron	0
Laiteron rude	20
Chénopode	0
Véronique de perse	24