

Scénario : non labour  
Exploitation : formation vivea  
Parcelle : 29/06  
Type de sol : argilo-limoneux

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

| Adventices :  | Risque : |  |
|---------------|----------|--|
| Vulpin        | 21 ( 42) |  |
| Matricaire    | 66 ( 77) |  |
| Chénopode     | 52 ( 62) |  |
| Laiteron rude | 52 ( 61) |  |
| Ray-grass     | 21 ( 39) |  |

### Scénario :

#### Année 1 - Betteraves

| Date de semis    | Étouffement culture                      | Interculture  | Date de labour      | Densité de semis |
|------------------|--|---|---------------------|------------------|
| Mar-d2           | Association de cultures :<br>Très faible | Août-d2 50%<br>Déc-d3 50%<br>Sep-d1 50%                             | Pas de labour       | 12 gr/m²         |
| Vulpin 38        | Vulpin 0                                 | Vulpin -5   | Vulpin 0            | Vulpin 0         |
| Matricaire 48    | Matricaire 0                             | Matricaire -3   | Matricaire 0        | Matricaire 0     |
| Chénopode 64     | Chénopode 0                              | Chénopode -3  | Chénopode 0         | Chénopode 0      |
| Laiteron rude 38 | Laiteron rude 0                          | Laiteron rude -2  | Laiteron rude 0     | Laiteron rude 0  |
| Ray-grass 35     | Ray-grass 0                              | Ray-grass -8  | Ray-grass 0         | Ray-grass 0      |
| Entre rangs      | Variété                                  | Désherbage mécanique  | Désherbage chimique | Score annuel     |
| 42 cm            | Non couvrante                            | Bineuse :<br>Mai-d3<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br>Mai-d1 |                     |                  |
| Vulpin 0         | Vulpin 0                                 | Vulpin 0  |                     | Vulpin 33        |
| Matricaire 0     | Matricaire 0                             | Matricaire -2   |                     | Matricaire 43    |
| Chénopode 0      | Chénopode 0                              | Chénopode -2  |                     | Chénopode 58     |
| Laiteron rude 0  | Laiteron rude 0                          | Laiteron rude -3  |                     | Laiteron rude 33 |
| Ray-grass 0      | Ray-grass 0                              | Ray-grass 0   |                     | Ray-grass 27     |

## Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis    | Étouffement culture                 | Interculture                                    | Date de labour      | Densité de semis |
|------------------|-------------------------------------|---|---------------------|------------------|
| Oct-d3           | Association de cultures :<br>Faible |   | Pas de labour       | 250 gr/m²        |
| Vulpin 35        | Vulpin -4                           | Vulpin 0  | Vulpin 0            | Vulpin 0         |
| Matricaire 26    | Matricaire -4                       | Matricaire 0                                    | Matricaire 0        | Matricaire 0     |
| Chénopode 8      | Chénopode -4                        | Chénopode 0                                     | Chénopode 0         | Chénopode 0      |
| Laiteron rude 28 | Laiteron rude -4                    | Laiteron rude 0                                 | Laiteron rude 0     | Laiteron rude 0  |
| Ray-grass 35     | Ray-grass -4                        | Ray-grass 0                                     | Ray-grass 0         | Ray-grass 0      |
| Entre rangs      | Variété                             | Désherbage mécanique                            | Désherbage chimique | Score annuel     |
| 15 cm            | Non couvrante                       | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille : |                     |                  |
| Vulpin -1        | Vulpin 0                            | Vulpin 0  |                     | Vulpin 30        |
| Matricaire -1    | Matricaire 0                        | Matricaire 0                                    |                     | Matricaire 21    |
| Chénopode -1     | Chénopode 0                         | Chénopode 0                                     |                     | Chénopode 3      |
| Laiteron rude -1 | Laiteron rude 0                     | Laiteron rude 0                                 |                     | Laiteron rude 23 |
| Ray-grass -1     | Ray-grass 0                         | Ray-grass 0                                     |                     | Ray-grass 30     |

## Année 3 - Pomme de terre

| Date de semis    | Étouffement culture                      | Interculture  | Date de labour      | Densité de semis |
|------------------|--|---|---------------------|------------------|
| Avr-d2           | Association de cultures :<br>Très faible | Déc-d3 50%   Aoû-d2 50%<br>Sep-d1 50%   | Pas de labour       | 12 gr/m²         |
| Vulpin 21        | Vulpin 0                                 | Vulpin -5   | Vulpin 0            | Vulpin 0         |
| Matricaire 42    | Matricaire 0                             | Matricaire -3   | Matricaire 0        | Matricaire 0     |
| Chénopode 63     | Chénopode 0                              | Chénopode -3  | Chénopode 0         | Chénopode 0      |
| Laiteron rude 57 | Laiteron rude 0                          | Laiteron rude -2  | Laiteron rude 0     | Laiteron rude 0  |
| Ray-grass 19     | Ray-grass 0                              | Ray-grass -8  | Ray-grass 0         | Ray-grass 0      |
| Entre rangs      | Variété                                  | Désherbage mécanique  | Désherbage chimique | Score annuel     |
| 42 cm            | Non couvrante                            | Bineuse :<br>Mai-d3   Mai-d1<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br>Mai-d1   Mai-d3 |                     |                  |
| Vulpin 0         | Vulpin 0                                 | Vulpin -2   |                     | Vulpin 14        |
| Matricaire 0     | Matricaire 0                             | Matricaire -7   |                     | Matricaire 32    |
| Chénopode 0      | Chénopode 0                              | Chénopode -11   |                     | Chénopode 49     |
| Laiteron rude 0  | Laiteron rude 0                          | Laiteron rude -12   |                     | Laiteron rude 44 |
| Ray-grass 0      | Ray-grass 0                              | Ray-grass -1  |                     | Ray-grass 10     |

## Année 4 - Blé d'hiver

### Date de semis

Oct-d3

|               |    |
|---------------|----|
| Vulpin        | 35 |
| Matricaire    | 26 |
| Chénopode     | 8  |
| Laiteron rude | 28 |
| Ray-grass     | 35 |

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Faible

|               |    |
|---------------|----|
| Vulpin        | -4 |
| Matricaire    | -4 |
| Chénopode     | -4 |
| Laiteron rude | -4 |
| Ray-grass     | -4 |

### Interculture

Oct-d2 50%

Sep-d3 50%

|               |     |
|---------------|-----|
| Vulpin        | -11 |
| Matricaire    | -3  |
| Chénopode     | -2  |
| Laiteron rude | -2  |
| Ray-grass     | -9  |

### Date de labour

Pas de labour

|               |   |
|---------------|---|
| Vulpin        | 0 |
| Matricaire    | 0 |
| Chénopode     | 0 |
| Laiteron rude | 0 |
| Ray-grass     | 0 |

### Densité de semis

250 gr/m²

|               |   |
|---------------|---|
| Vulpin        | 0 |
| Matricaire    | 0 |
| Chénopode     | 0 |
| Laiteron rude | 0 |
| Ray-grass     | 0 |

### Entre rangs

15 cm

|               |    |
|---------------|----|
| Vulpin        | -1 |
| Matricaire    | -1 |
| Chénopode     | -1 |
| Laiteron rude | -1 |
| Ray-grass     | -1 |

### Variété

Non couvrante

|               |   |
|---------------|---|
| Vulpin        | 0 |
| Matricaire    | 0 |
| Chénopode     | 0 |
| Laiteron rude | 0 |
| Ray-grass     | 0 |

### Désherbage mécanique

Bineuse :  
Houe rotative :  
Herse étrille :

|               |   |
|---------------|---|
| Vulpin        | 0 |
| Matricaire    | 0 |
| Chénopode     | 0 |
| Laiteron rude | 0 |
| Ray-grass     | 0 |

### Désherbage chimique

### Score annuel

|               |    |
|---------------|----|
| Vulpin        | 20 |
| Matricaire    | 19 |
| Chénopode     | 2  |
| Laiteron rude | 21 |
| Ray-grass     | 21 |