

Scénario : allongement de la rotation  
 Exploitation : formation vivea  
 Parcelle : 29/06  
 Type de sol : argilo-limoneux

**Commentaires :**
  

**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Vulpin	16 ( 42 )
Matricaire	64 ( 77 )
Chénopode	52 ( 62 )
Laiteron rude	59 ( 61 )
Ray-grass	16 ( 39 )

**Scénario :****Année 1 - Betteraves**

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50% Sep-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Matricaire 48	Matricaire 0	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Laiteron rude 38	Laiteron rude 0	Laiteron rude -2	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Ray-grass 35	Ray-grass 0	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille : Mai-d1		Vulpin 33
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Matricaire 44
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -2		Chénopode 58
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -2		Laiteron rude 34
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude -3		Ray-grass 27
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Vulpin 0 Matricaire 0 Chénopode 0 Laiteron rude 0 Ray-grass 0	Pas de labour Vulpin 0 Matricaire 0 Chénopode 0 Laiteron rude 0 Ray-grass 0	250 gr/m <sup>2</sup> Vulpin 0 Matricaire 0 Chénopode 0 Laiteron rude 0 Ray-grass 0
15 cm	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Vulpin -1 Matricaire -1 Chénopode -1 Laiteron rude -1 Ray-grass -1	Non couvrante Vulpin 0 Matricaire 0 Chénopode 0 Laiteron rude 0 Ray-grass 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Matricaire 0 Chénopode 0 Laiteron rude 0 Ray-grass 0		Vulpin 30 Matricaire 21 Chénopode 3 Laiteron rude 23 Ray-grass 30
Entre rangs				

## Année 3 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Mar-d3 50% Aoû-d2 50% Sep-d1 50% Vulpin -7 Matricaire -5 Chénopode -7 Laiteron rude -3 Ray-grass -10	Pas de labour Vulpin 0 Matricaire 0 Chénopode 0 Laiteron rude 0 Ray-grass 0	12 gr/m <sup>2</sup> Vulpin 0 Matricaire 0 Chénopode 0 Laiteron rude 0 Ray-grass 0
42 cm	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Vulpin 0 Matricaire 0 Chénopode 0 Laiteron rude 0 Ray-grass 0	Non couvrante Vulpin 0 Matricaire 0 Chénopode 0 Laiteron rude 0 Ray-grass 0	Bineuse : Mai-d1 Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille : Mai-d3 Mai-d1 Vulpin -2 Matricaire -7 Chénopode -11 Laiteron rude -12 Ray-grass -1		Vulpin 12 Matricaire 29 Chénopode 46 Laiteron rude 43 Ray-grass 8
Entre rangs				

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50% Oct-d2 50%	Pas de labour	250 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin	-35	Vulpin -11	Vulpin 0	Vulpin 0
Matricaire	26	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0
Chénopode	8	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0
Laiteron rude	28	Laiteron rude -4	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Ray-grass	35	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin	-1	Vulpin 0		Vulpin 20
Matricaire	-1	Matricaire 0		Matricaire 19
Chénopode	-1	Chénopode 0		Chénopode 2
Laiteron rude	-1	Laiteron rude 0		Laiteron rude 21
Ray-grass	-1	Ray-grass 0		Ray-grass 21

## Année 5 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50% Sep-d1 50% Mar-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin	15	Vulpin -7	Vulpin 0	Vulpin 0
Matricaire	38	Matricaire -5	Matricaire 0	Matricaire 0
Chénopode	57	Chénopode -7	Chénopode 0	Chénopode 0
Laiteron rude	61	Laiteron rude -3	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Ray-grass	12	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin	0	Vulpin 0		Vulpin 8
Matricaire	0	Matricaire 0		Matricaire 33
Chénopode	0	Chénopode 0		Chénopode 51
Laiteron rude	0	Laiteron rude 0		Laiteron rude 57
Ray-grass	0	Ray-grass 0		Ray-grass 2

## Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50% Sep-d1 50% Jul-d3 50% Aoû-d2 50%	Pas de labour	250 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -11	Vulpin 0	Vulpin 0
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -6	Matricaire 0	Matricaire 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -6	Chénopode 0	Chénopode 0
Laiteron rude 28	Laiteron rude -4	Laiteron rude -4	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -13	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 19
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 16
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Laiteron rude -1	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Laiteron rude 19
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 17