

Scénario : TEST 2 AMELIORE  
Exploitation : FORMATION ODERA  
Parcelle : TEST 2  
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

  


**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :	
Brome mou	24 ( 42)	
Ray-grass	26 ( 47)	
Folle-avoine	6 ( 11)	
Gaillet	47 ( 35)	

**Scénario :**

**Année 1 - Colza d'hiver**

<p><b>Date de semis</b></p> <p>Aoû-d1</p> <p>Brome mou 69</p> <p>Ray-grass 73</p> <p>Folle-avoine 14</p> <p>Gaillet 5</p>	<p><b>Étouffement culture</b></p> <p>Association de cultures : Moyen</p> <p>Brome mou -6</p> <p>Ray-grass -6</p> <p>Folle-avoine -6</p> <p>Gaillet -6</p>	<p><b>Interculture</b></p> <p>Aoû-d1 50%</p> <p>Brome mou -1</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Gaillet 0</p>	<p><b>Date de labour</b></p> <p>Non définie</p> <p>Brome mou 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Gaillet 0</p>	<p><b>Densité de semis</b></p> <p>12 gr/m²</p> <p>Brome mou 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Gaillet 0</p>
<p><b>Entre rangs</b></p> <p>17 cm</p> <p>Brome mou -2</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Folle-avoine -2</p> <p>Gaillet -2</p>	<p><b>Variété</b></p> <p>Non couvrante</p> <p>Brome mou 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Gaillet 0</p>	<p><b>Désherbage mécanique</b></p> <p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Brome mou 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Gaillet 0</p>	<p><b>Désherbage chimique</b></p>	<p><b>Score annuel</b></p> <p>Brome mou 60</p> <p>Ray-grass 63</p> <p>Folle-avoine 6</p> <p>Gaillet 0</p>

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50%	Non définie	250 gr/m <sup>2</sup>
Brome mou 21	Brome mou -4	Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Folle-avoine 15	Folle-avoine -4	Folle-avoine -0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Brome mou 14
Brome mou 0	Brome mou -1	Brome mou 0		Ray-grass 10
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Folle-avoine 10
Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		Gaillet 79
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		

## Année 3 - Féverole d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50%	Non définie	12 gr/m <sup>2</sup>
Brome mou 20	Brome mou 0	Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0
Ray-grass 15	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Folle-avoine 3	Folle-avoine 0	Folle-avoine -0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Gaillet 82	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Brome mou 18
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0		Ray-grass 11
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Folle-avoine 2
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Gaillet 82
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		