

Scénario : deuxieme sans labour
Exploitation : feusse
Parcelle : pivot
Type de sol : sable limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Panic pied-de-coq	15 (20)
Renouée liseron	81 (87)
Carotte sauvage	88 (96)
Morelle	15 (20)
Chénopode	93 (100)

Scénario :

Année 1 - Mais

<p>Date de semis</p> <p>Avr-d1</p> <p>Panic pied-de-coq: 25</p> <p>Renouée liseron: 119</p> <p>Carotte sauvage: 59</p> <p>Morelle: 25</p> <p>Chénopode: 71</p>	<p>Étouffement culture</p> <p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Panic pied-de-coq: 0</p> <p>Renouée liseron: 0</p> <p>Carotte sauvage: 0</p> <p>Morelle: 0</p> <p>Chénopode: 0</p>	<p>Interculture</p> <p>Avr-d1 50%</p> <p>Nov-d3 50%</p> <p>Panic pied-de-coq: 0</p> <p>Renouée liseron: -3</p> <p>Carotte sauvage: -3</p> <p>Morelle: 0</p> <p>Chénopode: -3</p>	<p>Date de labour</p> <p>Pas de labour</p> <p>Panic pied-de-coq: 0</p> <p>Renouée liseron: 0</p> <p>Carotte sauvage: 0</p> <p>Morelle: 0</p> <p>Chénopode: 0</p>	<p>Densité de semis</p> <p>12 gr/m²</p> <p>Panic pied-de-coq: 0</p> <p>Renouée liseron: 0</p> <p>Carotte sauvage: 0</p> <p>Morelle: 0</p> <p>Chénopode: 0</p>
<p>Entre rangs</p> <p>42 cm</p> <p>Panic pied-de-coq: -2</p> <p>Renouée liseron: -2</p> <p>Carotte sauvage: -2</p> <p>Morelle: -2</p> <p>Chénopode: -2</p>	<p>Variété</p> <p>Non couvrante</p> <p>Panic pied-de-coq: 0</p> <p>Renouée liseron: 0</p> <p>Carotte sauvage: 0</p> <p>Morelle: 0</p> <p>Chénopode: 0</p>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Jun-d2, Mai-d1</p> <p>Houe rotative :</p> <p>Herse étrille :</p> <p>Panic pied-de-coq: -6</p> <p>Renouée liseron: -11</p> <p>Carotte sauvage: -5</p> <p>Morelle: -6</p> <p>Chénopode: -5</p>	<p>Désherbage chimique</p> <p>Jun-d1, Mai-d1, Mai-d2</p>	<p>Score annuel</p> <p>Panic pied-de-coq: 17</p> <p>Renouée liseron: 103</p> <p>Carotte sauvage: 50</p> <p>Morelle: 17</p> <p>Chénopode: 61</p>

Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Avr-d1</p> <p>Panic pied-de-coq 25</p> <p>Renouée liseron 119</p> <p>Carotte sauvage 59</p> <p>Morelle 25</p> <p>Chénopode 71</p>	<p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Carotte sauvage 0</p> <p>Morelle 0</p> <p>Chénopode 0</p>	<p>Nov-d3 50%</p> <p>Mar-d1 50%</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Carotte sauvage -2</p> <p>Morelle 0</p> <p>Chénopode -2</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Carotte sauvage 0</p> <p>Morelle 0</p> <p>Chénopode 0</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Carotte sauvage 0</p> <p>Morelle 0</p> <p>Chénopode 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>42 cm</p> <p>Panic pied-de-coq -2</p> <p>Renouée liseron -2</p> <p>Carotte sauvage -2</p> <p>Morelle -2</p> <p>Chénopode -2</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Carotte sauvage 0</p> <p>Morelle 0</p> <p>Chénopode 0</p>	<p>Bineuse : Avr-d1 Jun-d2</p> <p>Houe rotative :</p> <p>Herse étrille :</p> <p>Panic pied-de-coq -6</p> <p>Renouée liseron -7</p> <p>Carotte sauvage -4</p> <p>Morelle -6</p> <p>Chénopode -5</p>	<p>Mai-d1 Mai-d2</p> <p>Jun-d2</p>	<p>Panic pied-de-coq 17</p> <p>Renouée liseron 111</p> <p>Carotte sauvage 52</p> <p>Morelle 17</p> <p>Chénopode 62</p>