

Scénario : 3  
Exploitation : Formation  
Parcelle : Test  
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	4 ( 73)
Gaillet	24 ( 58)
Ray-grass	11 ( 68)
Chénopode	32 ( 18)

### Scénario :

#### Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jul-d3	Association de cultures : Moyen	Jul-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Vulpin 25	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 1	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 53	Ray-grass -6	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 36	Chénopode -6	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 15
Vulpin -2	Vulpin -2	Vulpin 0		Gaillet 0
Gaillet -2	Gaillet -2	Gaillet 0		Ray-grass 43
Ray-grass -2	Ray-grass -2	Ray-grass 0		Chénopode 24
Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode 0		

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50% Août-d1 50%	Oct-d3	351 gr/m²
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -11	Vulpin -14	Vulpin -2
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet -17	Gaillet -2
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -11	Ray-grass -10	Ray-grass -2
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d1	Fév-d3	Vulpin 0
Vulpin -2	Vulpin -2	Vulpin -1		Gaillet 61
Gaillet -2	Gaillet -2	Gaillet -1		Ray-grass 2
Ray-grass -2	Ray-grass -2	Ray-grass -1		Chénopode 0
Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode -2		

## Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Août-d1 50% Nov-d3 50%	Avr-d1	9 gr/m²
Vulpin 9	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin -11	Vulpin 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet -9	Gaillet 0
Ray-grass 6	Ray-grass 0	Ray-grass -7	Ray-grass -9	Ray-grass 0
Chénopode 57	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -5	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Très couvrante	Bineuse : Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1	Vulpin 0
Vulpin -2	Vulpin -2	Vulpin -1		Gaillet 0
Gaillet -2	Gaillet -2	Gaillet 0		Ray-grass 0
Ray-grass -2	Ray-grass -2	Ray-grass -0		Chénopode 42
Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode -3		

## Année 4 - Blé d'hiver

### Date de semis

Oct-d3

Vulpin	35
Gaillet	93
Ray-grass	35
Chénopode	8

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Faible

Vulpin	-4
Gaillet	-4
Ray-grass	-4
Chénopode	-4

### Interculture

Oct-d2 50% Oct-d1 50%  
Sep-d3 50%

Vulpin	-17
Gaillet	-11
Ray-grass	-13
Chénopode	-3

### Date de labour

Pas de labour

Vulpin	0
Gaillet	0
Ray-grass	0
Chénopode	0

### Densité de semis

351 gr/m²

Vulpin	-2
Gaillet	-2
Ray-grass	-2
Chénopode	-2

### Entre rangs

12 cm

Vulpin	-2
Gaillet	-2
Ray-grass	-2
Chénopode	-2

### Variété

Très couvrante

Vulpin	-2
Gaillet	-2
Ray-grass	-2
Chénopode	-2

### Désherbage mécanique

Bineuse :  
Houe rotative :  
Herse étrille :

Mar-d1

Vulpin	-1
Gaillet	-1
Ray-grass	-1
Chénopode	-2

### Désherbage chimique

Fév-d3

### Score annuel

Vulpin	7
Gaillet	71
Ray-grass	10
Chénopode	0