


Exploitation : Pigeon  
Parcelle : Parcelle  
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	46 

### Situation initiale :

#### Année 1 - Colza d'hiver

<b>Date de semis</b> Aoû-d3 Ray-grass 96	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Moyen Ray-grass -6	<b>Interculture</b> Aoû-d2 50% Ray-grass -3	<b>Date de labour</b> Non définie Ray-grass 0	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² Ray-grass 0
<b>Entre rangs</b> 12.5 cm Ray-grass -2	<b>Variété</b> Non couvrante Ray-grass 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	<b>Désherbage chimique</b> Déc-d1 Sep-d3 Aoû-d3	<b>Score annuel</b> Ray-grass 85

#### Année 2 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> Oct-d3 Ray-grass 35	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Faible Ray-grass -4	<b>Interculture</b> Aoû-d1 50% Oct-d3 50% Oct-d3 50% Ray-grass -8	<b>Date de labour</b> Non définie Ray-grass 0	<b>Densité de semis</b> 280 gr/m² Ray-grass 0
<b>Entre rangs</b> 12.5 cm Ray-grass -2	<b>Variété</b> Moyennement couvrante Ray-grass -1	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	<b>Désherbage chimique</b> Nov-d1 Mar-d1 Oct-d2	<b>Score annuel</b> Ray-grass 19

#### Année 3 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> Oct-d2 Ray-grass 52	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Faible Ray-grass -4	<b>Interculture</b> Oct-d1 50% Jul-d3 50% Ray-grass -5	<b>Date de labour</b> Non définie Ray-grass 0	<b>Densité de semis</b> 265 gr/m² Ray-grass 0
<b>Entre rangs</b> 12.5 cm Ray-grass -2	<b>Variété</b> Moyennement couvrante Ray-grass -1	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	<b>Désherbage chimique</b> Oct-d2 Nov-d1 Mar-d2 Sep-d1	<b>Score annuel</b> Ray-grass 40