

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

Lycée du Neubourg
Maïs Conventionnelle
Limon Profond


Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	14
Chénopode	51
Renouée des oiseaux	68

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver



Année 2 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Mar-d3 50% Avr-d1 50% Avr-d2 50% Aoû-d3 50% Sep-d2 50%	Avr-d1	10 gr/m ²
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -15	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Chénopode 63	Chénopode 0	Chénopode -13	Chénopode -2	Chénopode 0
Renouée des oiseaux 110	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -19	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
40 cm	Très couvrante	Bineuse : Jul-d1 Jun-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Jul-d2	Ray-grass 0 Chénopode 44 Renouée des oiseaux 85
Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -2		Chénopode 44
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux -1		Renouée des oiseaux 85

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Ray-grass 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0	Oct-d3	260 gr/m ²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Ray-grass 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mar-d2 Herse étrille :		Ray-grass 23 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 1
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 23
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 0
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 1

Année 4 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Aoû-d3 50% Mar-d2 50%	Mar-d2	20 gr/m ²
Ray-grass 33 Chénopode 66 Renouée des oiseaux 128	Ray-grass 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0	Ray-grass -6 Chénopode -4 Renouée des oiseaux -5	Ray-grass -4 Chénopode -2 Renouée des oiseaux -3	Ray-grass 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mai-d1 Herse étrille :	Avr-d3 Mar-d3	Ray-grass 20 Chénopode 55 Renouée des oiseaux 113
Ray-grass 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0	Ray-grass -2 Chénopode -2 Renouée des oiseaux -2	Ray-grass -1 Chénopode -3 Renouée des oiseaux -5		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Oct-d3 50% Sep-d1 50%	Pas de labour	200 gr/m ²
Ray-grass 35 Chénopode 8 Renouée des oiseaux 9	Ray-grass -4 Chénopode -4 Renouée des oiseaux -4	Ray-grass -8 Chénopode -2 Renouée des oiseaux 0	Ray-grass 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0	Ray-grass 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mar-d2 Herse étrille :		Ray-grass 20 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 2
Ray-grass -2 Chénopode -2 Renouée des oiseaux -2	Ray-grass -1 Chénopode -1 Renouée des oiseaux -1	Ray-grass 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0		

Année 6 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Mar-d3 50% Nov-d3 50% Sep-d3 50% Aoû-d3 50% Mar-d3 50%	Mar-d3	10 gr/m ²
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass -15	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -12	Chénopode -2	Chénopode 0
Renouée des oiseaux 128	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -18	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
40 cm	Très couvrante	Bineuse : Jun-d1 Jul-d1 Houe rotative : Herse étrille :	Jul-d3	Ray-grass 12 Chénopode 48 Renouée des oiseaux 103
Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0		Ray-grass 12
Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -2		Chénopode 48
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux -2		Renouée des oiseaux 103

Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Oct-d3 50%	Pas de labour	200 gr/m ²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -0	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mar-d2 Herse étrille :		Ray-grass 25 Chénopode 1 Renouée des oiseaux 2
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 25
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 1
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 2

Année 8 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Avr-d1 50% Mar-d3 50% Sep-d1 50% Aoû-d1 50%	Avr-d1	20 gr/m ²
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -11	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Chénopode 68	Chénopode 0	Chénopode -10	Chénopode -2	Chénopode 0
Renouée des oiseaux 112	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -13	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
40 cm	Très couvrante	Bineuse : Jun-d1 Jun-d3 Houe rotative : Herse étrille :	Jul-d1	Ray-grass 1 Chénopode 48 Renouée des oiseaux 90
Ray-grass -2	Ray-grass -2	Ray-grass 0		
Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode -4		
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux -2		