

Scénario :
Référence_Rotation_2 R2017
Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

13 Lauragais SDC

SYPPRE LAURAGAIS
SDC étalon
coteaux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	11 (16)
Coquelicot	53 (60)
Ammi élevé	67 (71)
Chénopode	58 (53)
Panic pied-de-coq	18 (7)

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Pas de labour	310 gr/m ²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot 55	Coquelicot -4	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Ammi élevé 39	Ammi élevé -4	Ammi élevé -2	Ammi élevé 0	Ammi élevé 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -4	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs				
15 cm	Moyennement couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Mar-d1 Nov-d1	Ray-grass 25
Coquelicot -1	Coquelicot -1	Coquelicot 0		Coquelicot 46
Ammi élevé -1	Ammi élevé -1	Ammi élevé 0		Ammi élevé 32
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 2
Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0		Panic pied-de-coq 0

Année 2 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Mar-d1 50% Sep-d1 50% Mar-d1 50%	Oct-d2	12 gr/m ²
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -7	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Coquelicot 38	Coquelicot 0	Coquelicot -5	Coquelicot -3	Coquelicot 0
Ammi élevé 50	Ammi élevé 0	Ammi élevé -5	Ammi élevé -1	Ammi élevé 0
Chénopode 63	Chénopode 0	Chénopode -6	Chénopode -1	Chénopode 0
Panic pied-de-coq 19	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2	Ray-grass 7 Coquelicot 30 Ammi élevé 44 Chénopode 55 Panic pied-de-coq 15
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		
Ammi élevé 0	Ammi élevé 0	Ammi élevé 0		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Pas de labour	310 gr/m ²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot 55	Coquelicot -4	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Ammi élevé 39	Ammi élevé -4	Ammi élevé -2	Ammi élevé 0	Ammi élevé 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -4	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Mar-d1	Ray-grass 25 Coquelicot 46 Ammi élevé 32 Chénopode 2 Panic pied-de-coq 0
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Coquelicot -1	Coquelicot -1	Coquelicot 0		
Ammi élevé -1	Ammi élevé -1	Ammi élevé 0		
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0		
Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0		

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50% Mar-d1 50% Mar-d1 50%	Oct-d2	12 gr/m ²
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -7	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Coquelicot 38	Coquelicot 0	Coquelicot -5	Coquelicot -3	Coquelicot 0
Ammi élevé 50	Ammi élevé 0	Ammi élevé -5	Ammi élevé -1	Ammi élevé 0
Chénopode 63	Chénopode 0	Chénopode -6	Chénopode -1	Chénopode 0
Panic pied-de-coq 19	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2	Ray-grass 7 Coquelicot 30 Ammi élevé 44 Chénopode 55 Panic pied-de-coq 15
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		
Ammi élevé 0	Ammi élevé 0	Ammi élevé 0		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		

Année 5 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Fév-d2 50% Sep-d1 50% Avr-d3 50%	Oct-d2	12 gr/m ²
Ray-grass 5	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Coquelicot 21	Coquelicot 0	Coquelicot -4	Coquelicot -3	Coquelicot 0
Ammi élevé 34	Ammi élevé 0	Ammi élevé -4	Ammi élevé -1	Ammi élevé 0
Chénopode 52	Chénopode 0	Chénopode -5	Chénopode -1	Chénopode 0
Panic pied-de-coq 58	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2	Ray-grass 0 Coquelicot 14 Ammi élevé 29 Chénopode 45 Panic pied-de-coq 53
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		
Ammi élevé 0	Ammi élevé 0	Ammi élevé 0		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		