

Scénario :
Référence_Rotation_4 R2017
Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

13 Lauragais SDC
SYPPRE LAURAGAIS
SDC étalon
coteaux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	33 (16)
Coquelicot	62 (60)
Ammi élevé	58 (71)
Chénopode	34 (53)
Panic pied-de-coq	6 (7)

Scénario :

Année 1 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Mar-d1 50% Sep-d1 50%	Oct-d2	12 gr/m ²
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -7	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Coquelicot 38	Coquelicot 0	Coquelicot -5	Coquelicot -1	Coquelicot 0
Ammi élevé 50	Ammi élevé 0	Ammi élevé -5	Ammi élevé -1	Ammi élevé 0
Chénopode 63	Chénopode 0	Chénopode -6	Chénopode -1	Chénopode 0
Panic pied-de-coq 19	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2	Ray-grass 8
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Coquelicot 30	Coquelicot 30
Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot 0	Ammi élevé 44	Ammi élevé 44
Ammi élevé 0	Ammi élevé -1	Ammi élevé 0	Chénopode 55	Chénopode 55
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0	Panic pied-de-coq 15	Panic pied-de-coq 15
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Pas de labour	310 gr/m ²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot 55	Coquelicot -4	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Ammi élevé 39	Ammi élevé -4	Ammi élevé -2	Ammi élevé 0	Ammi élevé 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -4	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Mar-d1	Ray-grass 25 Coquelicot 46 Ammi élevé 32 Chénopode 2 Panic pied-de-coq 0
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Coquelicot -1	Coquelicot -1	Coquelicot 0		
Ammi élevé -1	Ammi élevé -1	Ammi élevé 0		
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0		
Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0		

Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Jul-d3 50% Jul-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot 41	Coquelicot -6	Coquelicot -1	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Ammi élevé 18	Ammi élevé -6	Ammi élevé -2	Ammi élevé 0	Ammi élevé 0
Chénopode 31	Chénopode -6	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Panic pied-de-coq 30	Panic pied-de-coq -6	Panic pied-de-coq -9	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Aoû-d3 Nov-d2 Déc-d1	Ray-grass 90 Coquelicot 34 Ammi élevé 11 Chénopode 21 Panic pied-de-coq 14
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		
Ammi élevé 0	Ammi élevé 0	Ammi élevé 0		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Jul-d1 50% Oct-d2 50%	Pas de labour	310 gr/m ²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot 55	Coquelicot -4	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Ammi élevé 39	Ammi élevé -4	Ammi élevé -2	Ammi élevé 0	Ammi élevé 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -4	Panic pied-de-coq -6	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Mar-d1	Ray-grass 25 Coquelicot 46 Ammi élevé 31 Chénopode 0 Panic pied-de-coq 0
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Coquelicot -1	Coquelicot -1	Coquelicot 0		
Ammi élevé -1	Ammi élevé -1	Ammi élevé 0		
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0		
Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0		

Année 5 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Fort	Oct-d1 50% Jul-d2 50%	Pas de labour	220 gr/m ²
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot 59	Coquelicot -10	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Ammi élevé 34	Ammi élevé -10	Ammi élevé -2	Ammi élevé 0	Ammi élevé 0
Chénopode 5	Chénopode -10	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -10	Panic pied-de-coq -5	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d1 Nov-d1	Ray-grass 33 Coquelicot 45 Ammi élevé 21 Chénopode 0 Panic pied-de-coq 0
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Coquelicot -1	Coquelicot 0	Coquelicot 0		
Ammi élevé -1	Ammi élevé 0	Ammi élevé 0		
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		
Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		