

Scénario : ESSAI2
Exploitation : Lycée du Neubourg
Parcelle : Maïs Conventionnelle
Type de sol : Limon Profond

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	7 (14)
Chénopode	41 (51)
Renouée des oiseaux	51 (68)

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis Nov-d2 Ray-grass 7 Chénopode 6 Renouée des oiseaux 9	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4 Chénopode -4 Renouée des oiseaux -4	Interculture Août-d2 50% Oct-d1 50% Ray-grass -8 Chénopode -3 Renouée des oiseaux 0	Date de labour Oct-d2 Ray-grass -11 Chénopode -3 Renouée des oiseaux -3	Densité de semis 200 gr/m² Ray-grass 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs 12.5 cm Ray-grass -2 Chénopode -2 Renouée des oiseaux -2	Variété Moyennement couvrante Ray-grass -1 Chénopode -1 Renouée des oiseaux -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Mar-d2 Herse étrille : Ray-grass -2 Chénopode -3 Renouée des oiseaux -5	Désherbage chimique Mar-d2	Score annuel Ray-grass 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0

Année 2 - Betteraves

Date de semis <div>Avr-d2</div> <div>Ray-grass 19</div> <div>Chénopode 63</div> <div>Renouée des oiseaux 110</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Interculture <div>Avr-d2 50%</div> <div>Sep-d2 50%</div> <div>Mar-d3 50%</div> <div>Avr-d1 50%</div> <div>Août-d3 50%</div> <div>Ray-grass -15</div> <div>Chénopode -13</div> <div>Renouée des oiseaux -19</div>	Date de labour <div>Avr-d2</div> <div>Ray-grass -8</div> <div>Chénopode -5</div> <div>Renouée des oiseaux -6</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>
Entre rangs 42 cm <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Variété Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : <div>Jun-d1</div> <div>Jun-d3</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode -4</div> <div>Renouée des oiseaux -2</div>	Désherbage chimique <div>Mai-d1</div> <div>Jun-d1</div> <div>Avr-d2</div>	Score annuel <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 41</div> <div>Renouée des oiseaux 83</div>

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Nov-d2</div> <div>Ray-grass 7</div> <div>Chénopode 6</div> <div>Renouée des oiseaux 9</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible <div>Ray-grass -4</div> <div>Chénopode -4</div> <div>Renouée des oiseaux -4</div>	Interculture <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Date de labour <div>Oct-d3</div> <div>Ray-grass -10</div> <div>Chénopode -3</div> <div>Renouée des oiseaux -3</div>	Densité de semis 260 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>
Entre rangs 12.5 cm <div>Ray-grass -2</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Renouée des oiseaux -2</div>	Variété Moyennement couvrante <div>Ray-grass -1</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Renouée des oiseaux -1</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : <div>Mar-d2</div> Herse étrille : <div>Ray-grass -2</div> <div>Chénopode -3</div> <div>Renouée des oiseaux -5</div>	Désherbage chimique <div>Mar-d3</div>	Score annuel <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>

Année 4 - Lin de printemps

Date de semis <div>Mar-d3</div> <div>Ray-grass 33</div> <div>Chénopode 66</div> <div>Renouée des oiseaux 128</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Interculture <div>Aoû-d3 50%</div> <div>Mar-d2 50%</div> <div>Ray-grass -6</div> <div>Chénopode -4</div> <div>Renouée des oiseaux -5</div>	Date de labour <div>Mar-d3</div> <div>Ray-grass -9</div> <div>Chénopode -5</div> <div>Renouée des oiseaux -6</div>	Densité de semis 2000 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>
Entre rangs 12.5 cm <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Variété Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Avr-d2</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Chénopode -3</div> <div>Renouée des oiseaux -7</div>	Désherbage chimique <div>Mar-d3</div> <div>Mai-d1</div>	Score annuel <div>Ray-grass 17</div> <div>Chénopode 54</div> <div>Renouée des oiseaux 111</div>

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Nov-d2</div> <div>Ray-grass 7</div> <div>Chénopode 6</div> <div>Renouée des oiseaux 9</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible <div>Ray-grass -4</div> <div>Chénopode -4</div> <div>Renouée des oiseaux -4</div>	Interculture <div>Sep-d1 50%</div> <div>Oct-d3 50%</div> <div>Ray-grass -8</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Densité de semis 200 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>
Entre rangs 12.5 cm <div>Ray-grass -2</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Renouée des oiseaux -2</div>	Variété Moyennement couvrante <div>Ray-grass -1</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Renouée des oiseaux -1</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Mar-d2</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Chénopode -3</div> <div>Renouée des oiseaux -5</div>	Désherbage chimique <div>Mar-d3</div>	Score annuel <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>

Année 6 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d3 Ray-grass 96 Chénopode 31 Renouée des oiseaux 0	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Ray-grass -6 Chénopode -6 Renouée des oiseaux -6	Interculture Non définie 1% Ray-grass 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0	Date de labour Aoû-d3 Ray-grass -11 Chénopode -4 Renouée des oiseaux -3	Densité de semis 35 gr/m² Ray-grass 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs 12.5 cm Ray-grass -2 Chénopode -2 Renouée des oiseaux -2	Variété Très couvrante Ray-grass -2 Chénopode -2 Renouée des oiseaux -2	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0	Désherbage chimique Oct-d1 Sep-d1	Score annuel Ray-grass 75 Chénopode 17 Renouée des oiseaux 0

Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis Nov-d2 Ray-grass 7 Chénopode 6 Renouée des oiseaux 9	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4 Chénopode -4 Renouée des oiseaux -4	Interculture Oct-d3 50% Ray-grass -3 Chénopode -0 Renouée des oiseaux 0	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0	Densité de semis 200 gr/m² Ray-grass 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs 12.5 cm Ray-grass -2 Chénopode -2 Renouée des oiseaux -2	Variété Moyennement couvrante Ray-grass -1 Chénopode -1 Renouée des oiseaux -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass -2 Chénopode -3 Renouée des oiseaux -5	Désherbage chimique Mar-d3	Score annuel Ray-grass 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0

Année 8 - Maïs

Date de semis

Mai-d2

Ray-grass 4

Chénopode 52

Renouée des oiseaux
48

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Très faible

Ray-grass 0

Chénopode 0

Renouée des oiseaux
0

Interculture

Mar-d3 50%

Avr-d1 50%

Août-d1 50%

Sep-d1 50%

Ray-grass -11

Chénopode -10

Renouée des oiseaux
-13

Date de labour

Mai-d2

Ray-grass -7

Chénopode -4

Renouée des oiseaux
-5

Densité de semis

12 gr/m²

Ray-grass 0

Chénopode 0

Renouée des oiseaux
0

Entre rangs

75 cm

Ray-grass 0

Chénopode 0

Renouée des oiseaux
0

Variété

Non couvrante

Ray-grass 0

Chénopode 0

Renouée des oiseaux
0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Jun-d1

Jun-d3

Houe rotative :

Herse étrille :

Ray-grass 0

Chénopode -4

Renouée des oiseaux
-2

Désherbage chimique

Mai-d3

Score annuel

Ray-grass 0

Chénopode 34

Renouée des oiseaux
28