


Scénario : Nouveau scénario
Exploitation : Pernel
Parcelle : Test V2 200619
Type de sol : Limoneux

Commentaires :

Pente

Rond de vulpins résistants

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	57 (46) 

Scénario :

Année 1 - Betteraves

<p>Date de semis</p> <p>Mar-d2</p> <p>Chénopode 64</p>	<p>Étouffement culture</p> <p>Association de cultures : Fort</p> <p>Chénopode -10</p>	<p>Interculture</p> <p>Aoû-d2 50%</p> <p>Sep-d1 50%</p> <p>Chénopode -3</p>	<p>Date de labour</p> <p>Déc-d1</p> <p>Chénopode -2</p>	<p>Densité de semis</p> <p>8 gr/m²</p> <p>Chénopode 0</p>
<p>Entre rangs</p> <p>45 cm</p> <p>Chénopode 0</p>	<p>Variété</p> <p>Non couvrante</p> <p>Chénopode 0</p>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Mai-d3</p> <p>Houe rotative :</p> <p>Herse étrille :</p> <p>Chénopode -2</p>	<p>Désherbage chimique</p> <p>Mar-d3 Mai-d2 Avr-d3</p> <p>Avr-d1</p>	<p>Score annuel</p> <p>Chénopode 46</p>

Année 2 - Blé d'hiver

<p>Date de semis</p> <p>Oct-d2</p> <p>Chénopode 11</p>	<p>Étouffement culture</p> <p>Association de cultures : Faible</p> <p>Chénopode -4</p>	<p>Interculture</p> <p>Sep-d3 70%</p> <p>Chénopode -2</p>	<p>Date de labour</p> <p>Pas de labour</p> <p>Chénopode 0</p>	<p>Densité de semis</p> <p>200 gr/m²</p> <p>Chénopode 0</p>
<p>Entre rangs</p> <p>15 cm</p> <p>Chénopode -1</p>	<p>Variété</p> <p>Non couvrante</p> <p>Chénopode 0</p>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : </p> <p>Houe rotative : </p> <p>Herse étrille : </p> <p>Chénopode 0</p>	<p>Désherbage chimique</p>	<p>Score annuel</p> <p>Chénopode 4</p>

Année 3 - Pois de printemps

<p>Date de semis</p> <p>Mar-d1</p> <p>Chénopode 58</p>	<p>Étouffement culture</p> <p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Chénopode 0</p>	<p>Interculture</p> <p>Sep-d1 50% Aoû-d1 50%</p> <p>Chénopode -3</p>	<p>Date de labour</p> <p>Déc-d2</p> <p>Chénopode -2</p>	<p>Densité de semis</p> <p>60 gr/m²</p> <p>Chénopode 0</p>
<p>Entre rangs</p> <p>15 cm</p> <p>Chénopode 0</p>	<p>Variété</p> <p>Non couvrante</p> <p>Chénopode 0</p>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : </p> <p>Houe rotative : </p> <p>Herse étrille : </p> <p>Avr-d1</p> <p>Chénopode -3</p>	<p>Désherbage chimique</p> <p>Avr-d3</p>	<p>Score annuel</p> <p>Chénopode 49</p>

Année 4 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d3 Chénopode 31	Étouffement culture Association de cultures : Moyen Chénopode -6	Interculture Aoû-d1 50% Chénopode -2	Date de labour Pas de labour Chénopode 0	Densité de semis 35 gr/m² Chénopode 0
Entre rangs 45 cm Chénopode 0	Variété Moyennement couvrante Chénopode -1	Désherbage mécanique Bineuse : Jan-d3 Sep-d3 Houe rotative : Herse étrille : Chénopode -1	Désherbage chimique Sep-d1	Score annuel Chénopode 21

Année 5 - Orge de printemps

Date de semis Mar-d1 Chénopode 58	Étouffement culture Association de cultures : Fort Chénopode -10	Interculture Sep-d1 50% Jul-d3 50% Chénopode -3	Date de labour Pas de labour Chénopode 0	Densité de semis 220 gr/m² Chénopode 0
Entre rangs 20 cm Chénopode 0	Variété Non couvrante Chénopode 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d2 Chénopode 0	Désherbage chimique	Score annuel Chénopode 45