


Scénario : Situation de départ Bray  
Exploitation : Dubuisson bray  
Parcelle : Betterave  
Type de sol : Limon

Commentaires :


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	16 ( 0) 

### Scénario :

#### Année 1 - Betteraves

<b>Date de semis</b> Mai-d3 Ray-grass 0	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4	<b>Interculture</b> Aoû-d2 50% Ray-grass -3	<b>Date de labour</b> Pas de labour Ray-grass 0	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² Ray-grass 0
<b>Entre rangs</b> 45 cm Ray-grass 0	<b>Variété</b> Moyennement couvrante Ray-grass -1	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	<b>Désherbage chimique</b> Mar-d2	<b>Score annuel</b> Ray-grass 0

#### Année 2 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> Oct-d2 Ray-grass 52	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4	<b>Interculture</b> Non définie 1% Ray-grass 0	<b>Date de labour</b> Pas de labour Ray-grass 0	<b>Densité de semis</b> 220 gr/m² Ray-grass 0
<b>Entre rangs</b> 12.5 cm Ray-grass -2	<b>Variété</b> Moyennement couvrante Ray-grass -1	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Mar-d2 Herse étrille : Ray-grass 0	<b>Désherbage chimique</b> Mar-d3	<b>Score annuel</b> Ray-grass 45

### Année 3 - Lin de printemps

<b>Date de semis</b> <div>Mar-d2</div> <div>Ray-grass 35</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Très faible <div>Ray-grass 0</div>	<b>Interculture</b> <div>Aoû-d2 50%</div> <div>Ray-grass -3</div>	<b>Date de labour</b> <div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div>	<b>Densité de semis</b> 2000 gr/m² <div>Ray-grass 0</div>
<b>Entre rangs</b> 12.5 cm <div>Ray-grass 0</div>	<b>Variété</b> Non couvrante <div>Ray-grass 0</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Avr-d2</div> <div>Ray-grass -2</div>	<b>Désherbage chimique</b> <div>Mai-d1</div>	<b>Score annuel</b> <div>Ray-grass 30</div>

### Année 4 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> <div>Nov-d1</div> <div>Ray-grass 18</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Faible <div>Ray-grass -4</div>	<b>Interculture</b> <div>Non définie 1%</div> <div>Ray-grass 0</div>	<b>Date de labour</b> <div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div>	<b>Densité de semis</b> 220 gr/m² <div>Ray-grass 0</div>
<b>Entre rangs</b> 12.5 cm <div>Ray-grass -2</div>	<b>Variété</b> Moyennement couvrante <div>Ray-grass -1</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : <div>Mar-d2</div> Herse étrille : <div>Ray-grass -2</div>	<b>Désherbage chimique</b> <div>Mar-d1</div>	<b>Score annuel</b> <div>Ray-grass 10</div>

### Année 5 - Pomme de terre

<b>Date de semis</b> <div>Avr-d2</div> <div>Ray-grass 19</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Très faible <div>Ray-grass 0</div>	<b>Interculture</b> <div>Aoû-d2 50%</div> <div>Ray-grass -3</div>	<b>Date de labour</b> <div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div>	<b>Densité de semis</b> 7 gr/m² <div>Ray-grass 0</div>
<b>Entre rangs</b> 90 cm <div>Ray-grass 0</div>	<b>Variété</b> Très couvrante <div>Ray-grass -2</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Avr-d3</div> <div>Ray-grass -1</div>	<b>Désherbage chimique</b> <div>Jun-d1</div>	<b>Score annuel</b> <div>Ray-grass 13</div>

### Année 6 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> <div>Nov-d1</div> <div>Ray-grass 18</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Faible <div>Ray-grass -4</div>	<b>Interculture</b> <div>Non définie 1%</div> <div>Ray-grass 0</div>	<b>Date de labour</b> <div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div>	<b>Densité de semis</b> 220 gr/m² <div>Ray-grass 0</div>
<b>Entre rangs</b> 12.5 cm <div>Ray-grass -2</div>	<b>Variété</b> Moyennement couvrante <div>Ray-grass -1</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : <div>Mar-d2</div> Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div>	<b>Désherbage chimique</b> <div>Mar-d3</div>	<b>Score annuel</b> <div>Ray-grass 11</div>