

Exploitation : earl SAGAERT
Parcelle : SAGAERT1
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	43	
Ray-grass	42	
Véronique FDL	51	
Pensée des champs	77	

Situation initiale :

Année 1 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Août-d2	Pas de labour	200 gr/m²
Vulpin 56	Vulpin -10	Date de semis du couvert : Non définie	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Date de destruction : Non définie	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Véronique FDL 61	Véronique FDL -10		Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Pensée des champs 55	Pensée des champs -10	Vulpin -1	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0
		Ray-grass -3		
		Véronique FDL 0		
		Pensée des champs -0		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3 Août-d3 Mar-d3	Vulpin 42
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Ray-grass 32
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Véronique FDL 48
Véronique FDL -2	Véronique FDL -1	Véronique FDL 0		Pensée des champs 42
Pensée des champs -2	Pensée des champs -1	Pensée des champs 0		

Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis Sep-d1 Vulpin 103 Ray-grass 97 Véronique FDL 7 Pensée des champs 20	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Vulpin -6 Ray-grass -6 Véronique FDL -6 Pensée des champs -6	Interculture Date des faux semis : Jul-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin 0 Ray-grass -1 Véronique FDL 0 Pensée des champs -0	Date de labour Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0 Véronique FDL 0 Pensée des champs 0	Densité de semis 40 gr/m² Vulpin 0 Ray-grass 0 Véronique FDL 0 Pensée des champs 0
Entre rangs 25 cm Vulpin -2 Ray-grass -2 Véronique FDL -2 Pensée des champs -2	Variété Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0 Véronique FDL 0 Pensée des champs 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Véronique FDL 0 Pensée des champs 0	Désherbage chimique Oct-d1 Sep-d1 Mar-d2	Score annuel Vulpin 95 Ray-grass 89 Véronique FDL 0 Pensée des champs 12

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d2 Vulpin 60 Ray-grass 52 Véronique FDL 68 Pensée des champs 63	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Vulpin -4 Ray-grass -4 Véronique FDL -4 Pensée des champs -4	Interculture Date des faux semis : Aoû-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin -3 Ray-grass -4 Véronique FDL 0 Pensée des champs -0	Date de labour Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0 Véronique FDL 0 Pensée des champs 0	Densité de semis 250 gr/m² Vulpin 0 Ray-grass 0 Véronique FDL 0 Pensée des champs 0
Entre rangs 12.5 cm Vulpin -2 Ray-grass -2 Véronique FDL -2 Pensée des champs -2	Variété Moyennement couvrante Vulpin -1 Ray-grass -1 Véronique FDL -1 Pensée des champs -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Véronique FDL 0 Pensée des champs 0	Désherbage chimique Oct-d3 Aoû-d3	Score annuel Vulpin 50 Ray-grass 41 Véronique FDL 61 Pensée des champs 56

Année 4 - Lin de printemps

Date de semis <div>Avr-d2</div> <div>Vulpin 21</div> <div>Ray-grass 19</div> <div>Véronique FDL 14</div> <div>Pensée des champs 33</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Pensée des champs 0</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Jul-d2</div> Date de destruction : <div>Nov-d2</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Pensée des champs 0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Pensée des champs 0</div>	Densité de semis 1900 gr/m ² <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Pensée des champs 0</div>
Entre rangs 12.5 cm <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Pensée des champs 0</div>	Variété Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Pensée des champs 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Pensée des champs 0</div>	Désherbage chimique <div>Jun-d1</div> <div>Avr-d2</div> <div>Mar-d3</div>	Score annuel <div>Vulpin 21</div> <div>Ray-grass 19</div> <div>Véronique FDL 14</div> <div>Pensée des champs 33</div>

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d2</div> <div>Vulpin 60</div> <div>Ray-grass 52</div> <div>Véronique FDL 68</div> <div>Pensée des champs 63</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible <div>Vulpin -4</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Véronique FDL -4</div> <div>Pensée des champs -4</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Aoû-d3</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Vulpin -3</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Pensée des champs -0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Pensée des champs 0</div>	Densité de semis 250 gr/m ² <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Pensée des champs 0</div>
Entre rangs 12.5 cm <div>Vulpin -2</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Véronique FDL -2</div> <div>Pensée des champs -2</div>	Variété Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Pensée des champs 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Pensée des champs 0</div>	Désherbage chimique <div>Oct-d3</div> <div>Oct-d2</div>	Score annuel <div>Vulpin 51</div> <div>Ray-grass 42</div> <div>Véronique FDL 62</div> <div>Pensée des champs 57</div>