

Exploitation :  
Parcelle :  
Type de sol :

Test 2020  
Test 1  
LIMON

Commentaires :

  

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	31	
Vulpin	28	
Chénopode	61	

## Situation initiale :

### Année 1 - Betteraves

<b>Date de semis</b> Mar-d3 Ray-grass 33 Vulpin 35 Chénopode 66	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Nov-d1 Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	<b>Date de labour</b> Mar-d2 Ray-grass -8 Vulpin -11 Chénopode -4	<b>Densité de semis</b> Non défini Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0
<b>Entre rangs</b> 45 cm Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	<b>Variété</b> Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Ray-grass 25 Vulpin 24 Chénopode 62

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	180 gr/m²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 31
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 31
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 4

## Année 3 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Nov-d2	Fév-d2	1800 gr/m²
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -7	Ray-grass 0
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -10	Vulpin 0
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 26
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 26
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 63

## Année 4 - Blé d'hiver

### Date de semis

Oct-d2

Ray-grass 52

Vulpin 60

Chénopode 11

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Aucune  
Faible

Ray-grass -4

Vulpin -4

Chénopode -4

### Interculture

Date des faux semis :

Sep-d2

Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Ray-grass -5

Vulpin -5

Chénopode -2

### Date de labour

Pas de labour

Ray-grass 0

Vulpin 0

Chénopode 0

### Densité de semis

180 gr/m²

Ray-grass 0

Vulpin 0

Chénopode 0

### Entre rangs

17 cm

Ray-grass 0

Vulpin 0

Chénopode 0

### Variété

Non couvrante

Ray-grass 0

Vulpin 0

Chénopode 0

### Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Herse étrille :

Ray-grass 0

Vulpin 0

Chénopode 0

### Désherbage chimique

### Score annuel

Ray-grass 43

Vulpin 51

Chénopode 5