

Scénario : Nouveau scénario
Exploitation : Test 2020
Parcelle : Test 1
Type de sol : LIMON

Commentaires :


Recul des date de semis printemps et automne. Ajout de faux semis Ajout de 2 binages en betteraves

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|--------------|----------|
| Ray-grass | 16 (31) |
| Vulpin | 13 (28) |
| Chénopode | 45 (61) |

Scénario :

Année 1 - Betteraves



Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|---|--|---------------------|-----------------------|
| Nov-d1 | Association de cultures : Aucune Faible | Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Pas de labour | 180 gr/m ² |
| Ray-grass 18 | Ray-grass -4 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Vulpin 14 | Vulpin -4 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Chénopode 6 | Chénopode -4 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 17 cm | Moyennement couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Ray-grass 0 | Ray-grass -1 | Ray-grass 0 | | Ray-grass 13 |
| Vulpin 0 | Vulpin -1 | Vulpin 0 | | Vulpin 9 |
| Chénopode 0 | Chénopode -1 | Chénopode 0 | | Chénopode 1 |

Année 3 - Lin de printemps

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|--|---|---------------------|------------------------|
| Avr-d1 | Association de cultures : Aucune Très faible | Date des faux semis : Avr-d1 Mar-d3 Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Nov-d2 | Fév-d2 | 1800 gr/m ² |
| Ray-grass 27 | Ray-grass 0 | Ray-grass -4 | Ray-grass -7 | Ray-grass 0 |
| Vulpin 28 | Vulpin 0 | Vulpin -4 | Vulpin -10 | Vulpin 0 |
| Chénopode 66 | Chénopode 0 | Chénopode -6 | Chénopode -3 | Chénopode 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 17 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Ray-grass 17 |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Vulpin 15 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | Chénopode 56 |

Année 4 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|---|---|---------------------|--|
| Oct-d3 | Association de cultures : Aucune Faible | Date des faux semis : Oct-d2 Oct-d1 Sep-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Pas de labour | 180 gr/m ² |
| Ray-grass 35 | Ray-grass -4 | Ray-grass -13 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Vulpin 35 | Vulpin -4 | Vulpin -16 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Chénopode 8 | Chénopode -4 | Chénopode -3 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 17 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | Ray-grass 17 Vulpin 15 Chénopode 1 |
| Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | |

Année 5 - Orge d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|---|---|---------------------|--|
| Oct-d2 | Association de cultures : Aucune Fort | Date des faux semis : Sep-d3 Sep-d1 Date de semis du couvert : Jan-d1 Date de destruction : Jan-d1 | Oct-d1 | gr/m ² |
| Ray-grass 48 | Ray-grass -10 | Ray-grass -10 | Ray-grass -12 | Ray-grass 0 |
| Vulpin 56 | Vulpin -10 | Vulpin -9 | Vulpin -17 | Vulpin 0 |
| Chénopode 5 | Chénopode -10 | Chénopode -3 | Chénopode -3 | Chénopode 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 17 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | Ray-grass 17 Vulpin 19 Chénopode 0 |
| Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | |