

Exploitation : FONTAINE
Parcelle : Parcelle 1
Type de sol : limon moyen

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	45 
Ray-grass	35 

Situation initiale :

Année 1 - Betteraves

Date de semis Mar-d2 Chénopode 64 Ray-grass 35	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0 Ray-grass 0	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Nov-d2 Chénopode 0 Ray-grass 0	Date de labour Nov-d2 Chénopode -2 Ray-grass -7	Densité de semis 10 gr/m² Chénopode 0 Ray-grass 0
Entre rangs 50 cm Chénopode 0 Ray-grass 0	Variété Moyennement couvrante Chénopode -1 Ray-grass -1	Désherbage mécanique Bineuse : Mai-d3 Mai-d2 Avr-d3 Houe rotative : Herse étrille : Avr-d3 Avr-d2 Chénopode -15 Ray-grass -4	Désherbage chimique Jun-d1 Mai-d2 Avr-d2 Mar-d3 Mar-d2	Score annuel Chénopode 46 Ray-grass 22

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d2 Chénopode 11 Ray-grass 52	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Chénopode -4 Ray-grass -4	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode 0 Ray-grass 0	Date de labour Pas de labour Chénopode 0 Ray-grass 0	Densité de semis 190 gr/m² Chénopode 0 Ray-grass 0
Entre rangs 17 cm Chénopode 0 Ray-grass 0	Variété Non couvrante Chénopode 0 Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique	Score annuel Chénopode 7 Ray-grass 48

