



Scénario : Nouveau scénario  
Exploitation : FONTAINE  
Parcelle : Parcelle 1  
Type de sol : limon moyen

Commentaires :


## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	50 ( 45) 
Ray-grass	28 ( 35) 

## Scénario :

### Année 1 - Betteraves

<b>Date de semis</b> <input type="text" value="Mar-d2"/> Chénopode <input type="text" value="64"/> Ray-grass <input type="text" value="35"/>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode <input type="text" value="0"/> Ray-grass <input type="text" value="0"/>	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : <input type="text" value="Aoû-d3"/> Date de destruction : <input type="text" value="Nov-d2"/> Chénopode <input type="text" value="0"/> Ray-grass <input type="text" value="0"/>	<b>Date de labour</b> <input type="text" value="Nov-d2"/> Chénopode <input type="text" value="-1"/> Ray-grass <input type="text" value="-4"/>	<b>Densité de semis</b> 10 gr/m² Chénopode <input type="text" value="0"/> Ray-grass <input type="text" value="0"/>
<b>Entre rangs</b> 50 cm Chénopode <input type="text" value="0"/> Ray-grass <input type="text" value="0"/>	<b>Variété</b> Moyennement couvrante Chénopode <input type="text" value="-1"/> Ray-grass <input type="text" value="-1"/>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : <input type="text" value="Mai-d3"/> <input type="text" value="Mai-d2"/> <input type="text" value="Avr-d3"/> Houe rotative : Herse étrille : <input type="text" value="Avr-d2"/> <input type="text" value="Avr-d3"/> Chénopode <input type="text" value="-15"/> Ray-grass <input type="text" value="-4"/>	<b>Désherbage chimique</b> <input type="text" value="Mar-d2"/> <input type="text" value="Mar-d3"/> <input type="text" value="Avr-d2"/> <input type="text" value="Mai-d2"/> <input type="text" value="Jun-d1"/>	<b>Score annuel</b> Chénopode <input type="text" value="47"/> Ray-grass <input type="text" value="26"/>

## Année 2 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> Oct-d2 Chénopode 11 Ray-grass 52	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Faible Chénopode -4 Ray-grass -4	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode 0 Ray-grass 0	<b>Date de labour</b> Pas de labour Chénopode 0 Ray-grass 0	<b>Densité de semis</b> 190 gr/m² Chénopode 0 Ray-grass 0
<b>Entre rangs</b> 35 cm Chénopode 0 Ray-grass 0	<b>Variété</b> Non couvrante Chénopode 0 Ray-grass 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Ray-grass 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Chénopode 7 Ray-grass 48

## Année 3 - Avoine de printemps

<b>Date de semis</b> Fév-d3 Chénopode 49 Ray-grass 28	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Fort Chénopode -10 Ray-grass -10	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Nov-d3 Chénopode 0 Ray-grass 0	<b>Date de labour</b> Nov-d3 Chénopode -1 Ray-grass -3	<b>Densité de semis</b> gr/m² Chénopode 0 Ray-grass 0
<b>Entre rangs</b> 35 cm Chénopode 0 Ray-grass 0	<b>Variété</b> Très couvrante Chénopode -2 Ray-grass -2	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Ray-grass 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Chénopode 35 Ray-grass 13