

Exploitation : FONTAINE
 Parcelle : parcelle 1
 Type de sol : limon moyen

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	22
Chénopode	43
Ray-grass	22

Situation initiale :

Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Nov-d3	Nov-d3	10 gr/m ²
Ray-grass 35	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0
Ray-grass 35	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Jun-d1 Mai-d1 Avr-d3	Jun-d1 Mai-d2 Avr-d3 Avr-d1 Mar-d3	Ray-grass 18
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Houe rotative : Herse étrille : Avr-d3 Avr-d2	Ray-grass -10	Chénopode 46
Chénopode 0	Chénopode -1		Chénopode -15	Ray-grass 18
Ray-grass 0	Ray-grass -1		Ray-grass -10	

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d3 Sep-d1 Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	180 gr/m ²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -23	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -5	Chénopode 0	Chénopode 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -23	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 25
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 2
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 25