

Scénario : Nouveau scénario
Exploitation : EARL Brayer
Parcelle : Barbacaine
Type de sol : limon moyen

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : | |
|--------------|----------|--|
| Agrostis | 19 (19) | |
| Chénopode | 62 (62) | |
| Gaillet | 21 (21) | |
| Matricaire | 72 (72) | |

Scénario :

Année 1 - Pomme de terre

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---|--|--|--|--|
| <p>Avr-d2</p> <p>Agrostis 1</p> <p>Chénopode 63</p> <p>Gaillet 2</p> <p>Matricaire 42</p> | <p>Association de cultures : Aucune</p> <p>Très faible</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Matricaire 0</p> | <p>Date des faux semis : Date de semis du couvert :</p> <p>Août-d2</p> <p>Date de destruction : Déc-d2</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Matricaire 0</p> | <p>Déc-d2</p> <p>Agrostis -6</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Gaillet -13</p> <p>Matricaire -2</p> | <p>5 gr/m²</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Matricaire 0</p> |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| <p>90 cm</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Matricaire 0</p> | <p>Très couvrante</p> <p>Agrostis -2</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Gaillet -2</p> <p>Matricaire -2</p> | <p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Matricaire 0</p> | <p>Avr-d3</p> | <p>Agrostis 0</p> <p>Chénopode 58</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Matricaire 38</p> |

Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|---|--|---------------------|------------------|
| Oct-d1 | Association de cultures : Aucune Faible | Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Pas de labour | 220 gr/m² |
| Agrostis 32 | Agrostis -4 | Agrostis 0 | Agrostis 0 | Agrostis 0 |
| Chénopode 15 | Chénopode -4 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| Gaillet 95 | Gaillet -4 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Matricaire 32 | Matricaire -4 | Matricaire 0 | Matricaire 0 | Matricaire 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 15 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Oct-d3 | Agrostis 27 |
| Agrostis -1 | Agrostis 0 | Agrostis 0 | | Chénopode 10 |
| Chénopode -1 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | Gaillet 90 |
| Gaillet -1 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Matricaire 27 |
| Matricaire -1 | Matricaire 0 | Matricaire 0 | | |

Année 3 - Epinard

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|--|---|---------------------|------------------|
| Avr-d3 | Association de cultures : Aucune Très faible | Date des faux semis : Date de semis du couvert : Août-d2 Date de destruction : Déc-d1 | Déc-d1 | 160 gr/m² |
| Agrostis 0 | Agrostis 0 | Agrostis 0 | Agrostis -5 | Agrostis 0 |
| Chénopode 57 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode -2 | Chénopode 0 |
| Gaillet 1 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet -13 | Gaillet 0 |
| Matricaire 38 | Matricaire 0 | Matricaire 0 | Matricaire -2 | Matricaire 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 20 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Avr-d3 | Agrostis 0 |
| Agrostis 0 | Agrostis 0 | Agrostis 0 | | Chénopode 55 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | Gaillet 0 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Matricaire 36 |
| Matricaire 0 | Matricaire 0 | Matricaire 0 | | |

Année 4 - Haricot

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|--|--|---------------------|------------------|
| Août-d2 | Association de cultures : Aucune Très faible | Date des faux semis : Jul-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Pas de labour | 80 gr/m² |
| Agrostis 5 | Agrostis 0 | Agrostis 0 | Agrostis 0 | Agrostis 0 |
| Chénopode 34 | Chénopode 0 | Chénopode -2 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| Gaillet 13 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Matricaire 30 | Matricaire 0 | Matricaire -1 | Matricaire 0 | Matricaire 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 20 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Août-d2 | |
| Agrostis 0 | Agrostis 0 | Agrostis 0 | | Agrostis 5 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | Chénopode 32 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Gaillet 13 |
| Matricaire 0 | Matricaire 0 | Matricaire 0 | | Matricaire 29 |

Année 5 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|---|--|---------------------|------------------|
| Oct-d2 | Association de cultures : Aucune Faible | Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Pas de labour | 220 gr/m² |
| Agrostis 36 | Agrostis -4 | Agrostis 0 | Agrostis 0 | Agrostis 0 |
| Chénopode 11 | Chénopode -4 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| Gaillet 97 | Gaillet -4 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Matricaire 29 | Matricaire -4 | Matricaire 0 | Matricaire 0 | Matricaire 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 15 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Nov-d1 | |
| Agrostis -1 | Agrostis 0 | Agrostis 0 | | Agrostis 31 |
| Chénopode -1 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | Chénopode 6 |
| Gaillet -1 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Gaillet 93 |
| Matricaire -1 | Matricaire 0 | Matricaire 0 | | Matricaire 24 |

Année 6 - Betteraves

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|--|--|-------------------------|----------------------|
| Mar-d3 | Association de cultures : Aucune Très faible | Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Déc-d1 | Déc-d1 | 10 gr/m ² |
| Agrostis 9 | Agrostis 0 | Agrostis 0 | Agrostis -5 | Agrostis 0 |
| Chénopode 66 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode -2 | Chénopode 0 |
| Gaillet 4 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet -13 | Gaillet 0 |
| Matricaire 47 | Matricaire 0 | Matricaire 0 | Matricaire -2 | Matricaire 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 45 cm | Moyennement couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Avr-d1 Avr-d2 Mai-d1 | Agrostis 3 |
| Agrostis 0 | Agrostis -1 | Agrostis 0 | | Chénopode 63 |
| Chénopode 0 | Chénopode -1 | Chénopode 0 | | Gaillet 0 |
| Gaillet 0 | Gaillet -1 | Gaillet 0 | | Matricaire 44 |
| Matricaire 0 | Matricaire -1 | Matricaire 0 | | |

Année 7 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|---|--|---------------------|-----------------------|
| Oct-d3 | Association de cultures : Aucune Faible | Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Oct-d3 | 360 gr/m ² |
| Agrostis 40 | Agrostis -4 | Agrostis 0 | Agrostis -4 | Agrostis -2 |
| Chénopode 8 | Chénopode -4 | Chénopode 0 | Chénopode -3 | Chénopode -2 |
| Gaillet 93 | Gaillet -4 | Gaillet 0 | Gaillet -17 | Gaillet -2 |
| Matricaire 26 | Matricaire -4 | Matricaire 0 | Matricaire -2 | Matricaire -2 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 15 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Oct-d3 | Agrostis 28 |
| Agrostis -1 | Agrostis 0 | Agrostis 0 | | Chénopode 0 |
| Chénopode -1 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | Gaillet 70 |
| Gaillet -1 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Matricaire 17 |
| Matricaire -1 | Matricaire 0 | Matricaire 0 | | |