

Scénario : Scénario 19022020  
 Exploitation : FONTAINE  
 Parcelle : parcelle 1  
 Type de sol : limon moyen

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	19 ( 22)
Chénopode	49 ( 43)
Ray-grass	19 ( 22)

### Scénario :

#### Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : <b>Aoû-d3</b> Date de destruction : <b>Nov-d3</b>	Nov-d3	10 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 35	Ray-grass 0 Chénopode 0 Ray-grass 0	Ray-grass 0 Chénopode 0 Ray-grass 0	Ray-grass -3 Chénopode -1 Ray-grass -3	Ray-grass 0 Chénopode 0 Ray-grass 0
Chénopode 64				
Ray-grass 35				
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : <b>Avr-d3</b> <b>Mai-d1</b> <b>Jun-d1</b> Houe rotative : Herse étrille : <b>Avr-d2</b> <b>Avr-d3</b>	Mar-d3 <b>Avr-d1</b> <b>Avr-d3</b> Mai-d2 <b>Jun-d1</b>	Ray-grass 21 Chénopode 47 Ray-grass 21
Ray-grass 0	Ray-grass -1 Chénopode -1 Ray-grass -1	Ray-grass -10 Chénopode -15 Ray-grass -10	Ray-grass -10 Chénopode -15 Ray-grass -10	
Chénopode 0				
Ray-grass 0				

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : <b>Aoû-d1</b> <b>Sep-d1</b> <b>Sep-d3</b> Date de semis du couvert : <b>Non définie</b> Date de destruction : <b>Non définie</b>	Pas de labour	180 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -23	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -5	Chénopode 0	Chénopode 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -23	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 25
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 2
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 25

## Année 3 - Avoine de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : <b>Jan-d1</b> Date de destruction : <b>Jan-d1</b>	Jan-d1	gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 28	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Chénopode 49	Chénopode -10	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Ray-grass 28	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 13
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 35
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 13