


Scénario : Nouveau scénario
Exploitation : FONTAINE
Parcelle : Parcelle 1
Type de sol : limon moyen

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	50 (45) 

Scénario :

Année 1 - Betteraves

Date de semis Mar-d2 Chénopode 64	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Août-d3 Date de destruction : Nov-d2 Chénopode 0	Date de labour Nov-d2 Chénopode -1	Densité de semis 10 gr/m² Chénopode 0
Entre rangs 50 cm Chénopode 0	Variété Moyennement couvrante Chénopode -1	Désherbage mécanique Bineuse : Mai-d3 Mai-d2 Avr-d3 Houe rotative : Herse étrille : Avr-d3 Avr-d2 Chénopode -15	Désherbage chimique Jun-d1 Mai-d2 Avr-d2 Mar-d3 Mar-d2	Score annuel Chénopode 47

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d2 Chénopode 11	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Chénopode -4	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode 0	Date de labour Pas de labour Chénopode 0	Densité de semis 190 gr/m² Chénopode 0
Entre rangs 35 cm Chénopode 0	Variété Non couvrante Chénopode 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0	Désherbage chimique	Score annuel Chénopode 7

Année 3 - Avoine de printemps

Date de semis

Fév-d3

Chénopode 49

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Fort

Chénopode -10

Interculture

Date des faux semis :
Date de semis du couvert :

Aoû-d3

Date de destruction :

Nov-d3

Chénopode 0

Date de labour

Nov-d3

Chénopode -1

Densité de semis

gr/m²

Chénopode 0

Entre rangs

35 cm

Chénopode 0

Variété

Très couvrante

Chénopode -2

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Chénopode 0

Désherbage chimique

Score annuel

Chénopode 35