

Exploitation : FONTAINE
 Parcelle : Parcelle 1
 Type de sol : limon moyen

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	45
Ray-grass	35

Situation initiale :

Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Nov-d2	Nov-d2	10 gr/m ²
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0
Ray-grass 35	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -7	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Avr-d3 Mai-d2 Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille : Avr-d2 Avr-d3	Mar-d2 Mar-d3 Avr-d2 Mai-d2 Jun-d1	Chénopode 46 Ray-grass 22
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode -15		
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass -4		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	190 gr/m ²
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Ray-grass 0		Chénopode 7 Ray-grass 48
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

