

Scénario : Nouveau scénario  
 Exploitation : FONTAINE  
 Parcelle : Parcelle 1  
 Type de sol : limon moyen

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	50 ( 45 )

### Scénario :

#### Année 1 - Betteraves

Date de semis Mar-d2 Chénopode 64	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Nov-d2 Chénopode 0	Date de labour Nov-d2 Chénopode -1	Densité de semis 10 gr/m <sup>2</sup> Chénopode 0
Entre rangs 50 cm Chénopode 0	Variété Moyennement couvrante Chénopode -1	Désherbage mécanique Bineuse : Mai-d3 Mai-d2 Avr-d3 Houe rotative : Herse étrille : Avr-d2 Avr-d3 Chénopode -15	Désherbage chimique Mar-d2 Mar-d3 Avr-d2 Mai-d2 Jun-d1	Score annuel Chénopode 47

#### Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d2 Chénopode 11	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Chénopode -4	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode 0	Date de labour Pas de labour Chénopode 0	Densité de semis 190 gr/m <sup>2</sup> Chénopode 0
Entre rangs 35 cm Chénopode 0	Variété Non couvrante Chénopode 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0	Désherbage chimique	Score annuel Chénopode 7

### Année 3 - Avoine de printemps

<b>Date de semis</b> Fév-d3 Chénopode 49	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Fort Chénopode -10	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Nov-d3 Chénopode 0	<b>Date de labour</b> Nov-d3 Chénopode -1	<b>Densité de semis</b> gr/m <sup>2</sup> Chénopode 0
<b>Entre rangs</b> 35 cm Chénopode 0	<b>Variété</b> Très couvrante Chénopode -2	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0	<b>Désherbage chimique</b> Chénopode 0	<b>Score annuel</b> Chénopode 35