

Exploitation : bg
 Parcelle : A2 Betterave
 Type de sol : limon argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Séneçon vulgaire	73
Paturin	57
Chénopode	66
Ray-grass	18
Laiteron rude	64

Situation initiale :

Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Aoû-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Déc-d1 Séneçon vulgaire -1 Paturin -2 Chénopode -2 Ray-grass -3 Laiteron rude -1	Pas de labour	13 gr/m ²
Séneçon vulgaire 50	Séneçon vulgaire 0 Paturin 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Laiteron rude 53	Séneçon vulgaire 0 Paturin 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Laiteron rude 0	Séneçon vulgaire 0 Paturin 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Laiteron rude 0	Séneçon vulgaire 0 Paturin 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Laiteron rude 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Non définie Houe rotative : Non définie Herse étrille : Non définie Séneçon vulgaire 0 Paturin 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Laiteron rude 0	Avr-d3 Avr-d1 Mai-d2	Séneçon vulgaire 48 Paturin 37 Chénopode 63 Ray-grass 23 Laiteron rude 51

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1 Séneçon vulgaire 36 Paturin 17 Chénopode 6 Ray-grass 18 Laiteron rude 26	Association de cultures : Aucune Moyen Séneçon vulgaire -6 Paturin -6 Chénopode -6 Ray-grass -6 Laiteron rude -6	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Séneçon vulgaire 0 Paturin 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Laiteron rude 0	Pas de labour Séneçon vulgaire 0 Paturin 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Laiteron rude 0	320 gr/m ² Séneçon vulgaire 0 Paturin 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Laiteron rude 0
Entre rangs 17 cm Séneçon vulgaire 0 Paturin 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Laiteron rude 0	Variété Moyennement couvrante Séneçon vulgaire -1 Paturin -1 Chénopode -1 Ray-grass -1 Laiteron rude -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Séneçon vulgaire 0 Paturin 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Laiteron rude 0	Désherbage chimique Déc-d1 Avr-d2	Score annuel Séneçon vulgaire 29 Paturin 10 Chénopode 0 Ray-grass 11 Laiteron rude 19

Année 3 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1 Séneçon vulgaire 50 Paturin 40 Chénopode 66 Ray-grass 27 Laiteron rude 53	Association de cultures : Aucune Très faible Séneçon vulgaire 0 Paturin 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Laiteron rude 0	Date des faux semis : Aoû-d1 Mar-d3 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Déc-d1 Séneçon vulgaire -3 Paturin -4 Chénopode -5 Ray-grass -4 Laiteron rude -3	Pas de labour Séneçon vulgaire 0 Paturin 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Laiteron rude 0	13 gr/m ² Séneçon vulgaire 0 Paturin 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Laiteron rude 0
Entre rangs 50 cm Séneçon vulgaire 0 Paturin 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Laiteron rude 0	Variété Moyennement couvrante Séneçon vulgaire -1 Paturin -1 Chénopode -1 Ray-grass -1 Laiteron rude -1	Désherbage mécanique Bineuse : Jun-d1 Mai-d3 Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille : Séneçon vulgaire -7 Paturin -6 Chénopode -7 Ray-grass -1 Laiteron rude -9	Désherbage chimique Mai-d1 Avr-d3	Score annuel Séneçon vulgaire 40 Paturin 29 Chénopode 52 Ray-grass 22 Laiteron rude 41