

Scénario : Nouveau scénario  
 Exploitation : bg  
 Parcelle : A2 OP  
 Type de sol : limon argileux

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	19 ( 22 )
Paturin	48 ( 52 )
Chénopode	61 ( 78 )
Séneçon vulgaire	53 ( 53 )
Laiteron rude	51 ( 43 )

### Scénario :

#### Année 1 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Mar-d2</b>			<b>Pas de labour</b>	<b>300 gr/m<sup>2</sup></b>
Ray-grass 35	Ray-grass -10	Date des faux semis : <b>Aoû-d1</b>	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Paturin 36	Paturin -10	Date de semis du couvert : <b>Aoû-d2</b>	Paturin 0	Paturin 0
Chénopode 64	Chénopode -10	Date de destruction : <b>Déc-d1</b>	Chénopode 0	Chénopode 0
Séneçon vulgaire 40	Séneçon vulgaire -10	Ray-grass -2	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Laiteron rude 38	Laiteron rude -10	Paturin -2	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
		Chénopode -2		
		Séneçon vulgaire -1		
		Laiteron rude -1		
<b>Entre rangs</b>				
17 cm	<b>Variété</b>			
Ray-grass 0	Moyennement couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	<b>Score annuel</b>
Paturin 0	Ray-grass -1	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	<b>Avr-d2</b>	Ray-grass 22
Chénopode 0	Paturin -1	Ray-grass 0		Paturin 23
Séneçon vulgaire 0	Chénopode -1	Paturin 0		Chénopode 52
Laiteron rude 0	Séneçon vulgaire -1	Chénopode 0		Séneçon vulgaire 28
	Laiteron rude -1	Séneçon vulgaire 0		Laiteron rude 26

## Année 2 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Mai-d1</b>	<b>Association de cultures :</b> Aucune Fort	<b>Date des faux semis :</b> <b>Aoû-d1</b> <b>Avr-d3</b> <b>Avr-d1</b> <b>Date de semis du couvert :</b> <b>Aoû-d2</b> <b>Date de destruction :</b> <b>Déc-d1</b>	<b>Pas de labour</b>	<b>300 gr/m<sup>2</sup></b>
Ray-grass 5	Ray-grass -10	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Paturin 43	Paturin -10	Paturin -6	Paturin 0	Paturin 0
Chénopode 52	Chénopode -10	Chénopode -8	Chénopode 0	Chénopode 0
Séneçon vulgaire 48	Séneçon vulgaire -10	Séneçon vulgaire -5	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Laiteron rude 60	Laiteron rude -10	Laiteron rude -6	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
17 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Paturin 0	Paturin -2	Paturin 0		Paturin 25
Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0		Chénopode 32
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire 0		Séneçon vulgaire 31
Laiteron rude 0	Laiteron rude -2	Laiteron rude 0		Laiteron rude 42

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Nov-d1</b>	<b>Association de cultures :</b> Aucune Faible	<b>Date des faux semis :</b> <b>Oct-d1</b> <b>Date de semis du couvert :</b> <b>Jan-d1</b> <b>Date de destruction :</b> <b>Jan-d1</b>	<b>Pas de labour</b>	<b>300 gr/m<sup>2</sup></b>
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Paturin 17	Paturin -4	Paturin -1	Paturin 0	Paturin 0
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Séneçon vulgaire 36	Séneçon vulgaire -4	Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Laiteron rude 26	Laiteron rude -4	Laiteron rude -1	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
17 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass -2		Ray-grass 7
Paturin 0	Paturin -1	Paturin -2		Paturin 9
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode -3		Chénopode 0
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire -2		Séneçon vulgaire 28
Laiteron rude 0	Laiteron rude -1	Laiteron rude -2		Laiteron rude 18

## Année 4 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Aoû-d2</span>	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : <span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Jul-d3</span> Date de semis du couvert : <span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Aoû-d2</span> Date de destruction : <span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Jan-d1</span>	<span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Pas de labour</span>	40 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass      88	Ray-grass      -6	Ray-grass      0	Ray-grass      0	Ray-grass      0
Paturin        37	Paturin        -6	Paturin        0	Paturin        0	Paturin        0
Chénopode     34	Chénopode     -6	Chénopode     0	Chénopode     0	Chénopode     0
Séneçon vulgaire 21	Séneçon vulgaire -6	Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Laiteron rude    18	Laiteron rude    -6	Laiteron rude    -1	Laiteron rude    0	Laiteron rude    0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : <span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Sep-d2</span> <span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Mar-d2</span> Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass      0	Ray-grass      -1	Ray-grass      -5		Ray-grass      75
Paturin        0	Paturin        -1	Paturin        -1		Paturin        26
Chénopode     0	Chénopode     -1	Chénopode     -2		Chénopode     23
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire -1		Séneçon vulgaire 12
Laiteron rude    0	Laiteron rude    -1	Laiteron rude    -1		Laiteron rude    8

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Oct-d3</span>	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : <span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Oct-d1</span> <span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Jul-d3</span> Date de semis du couvert : <span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Jul-d3</span> Date de destruction : <span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Oct-d1</span>	<span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Pas de labour</span>	300 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass      35	Ray-grass      -6	Ray-grass      -5	Ray-grass      0	Ray-grass      0
Paturin        19	Paturin        -6	Paturin        -3	Paturin        0	Paturin        0
Chénopode     8	Chénopode     -6	Chénopode     -3	Chénopode     0	Chénopode     0
Séneçon vulgaire 41	Séneçon vulgaire -6	Séneçon vulgaire -3	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Laiteron rude    28	Laiteron rude    -6	Laiteron rude    -3	Laiteron rude    0	Laiteron rude    0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : <span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Mar-d3</span> Houe rotative : Herse étrille :	<span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Nov-d3</span>	
Ray-grass      0	Ray-grass      -1	Ray-grass      -2		Ray-grass      21
Paturin        0	Paturin        -1	Paturin        -2		Paturin        7
Chénopode     0	Chénopode     -1	Chénopode     -3		Chénopode     0
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire -2		Séneçon vulgaire 30
Laiteron rude    0	Laiteron rude    -1	Laiteron rude    -2		Laiteron rude    17

## Année 6 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Aoû-d1 Mar-d3 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Déc-d1	Pas de labour	13 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 27	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Paturin 40	Paturin 0	Paturin -4	Paturin 0	Paturin 0
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -5	Chénopode 0	Chénopode 0
Séneçon vulgaire 50	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -3	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Laiteron rude 53	Laiteron rude 0	Laiteron rude -3	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Jun-d1 Mai-d3 Mai-d2	Mai-d1 Avr-d3	Ray-grass 22
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Houe rotative : Herse étrille :		Paturin 29
Paturin 0	Paturin -1	Ray-grass -0		Chénopode 53
Chénopode 0	Chénopode -1	Paturin -6		Séneçon vulgaire 40
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -1	Chénopode -7		Laiteron rude 40
Laiteron rude 0	Laiteron rude -1	Séneçon vulgaire -7		
		Laiteron rude -9		

## Année 7 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	300 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 35	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Paturin 36	Paturin -10	Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0
Chénopode 64	Chénopode -10	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Séneçon vulgaire 40	Séneçon vulgaire -10	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Laiteron rude 38	Laiteron rude -10	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Avr-d2 Houe rotative : Herse étrille : Avr-d1		Ray-grass 20
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass -4		Paturin 22
Paturin 0	Paturin -1	Paturin -4		Chénopode 47
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode -7		Séneçon vulgaire 24
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire -4		Laiteron rude 23
Laiteron rude 0	Laiteron rude -1	Laiteron rude -4		

## Année 8 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Avr-d1</b>	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : <b>Aoû-d1</b> <b>Mar-d3</b> Date de semis du couvert : <b>Aoû-d2</b> Date de destruction : <b>Déc-d1</b>	<b>Pas de labour</b>	10 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 27	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Paturin 46	Paturin -4	Paturin -4	Paturin 0	Paturin 0
Chénopode 71	Chénopode -4	Chénopode -5	Chénopode 0	Chénopode 0
Séneçon vulgaire 54	Séneçon vulgaire -4	Séneçon vulgaire -3	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Laiteron rude 61	Laiteron rude -4	Laiteron rude -3	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
50 cm	Très couvrante	Bineuse : <b>Jun-d2</b> <b>Mai-d3</b> Houe rotative : Herse étrille :	<b>Avr-d1</b>	Ray-grass 15 Paturin 30 Chénopode 54 Séneçon vulgaire 40 Laiteron rude 44
Ray-grass -2	Ray-grass -2	Ray-grass 0		
Paturin -2	Paturin -2	Paturin -4		
Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode -4		
Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire -4		
Laiteron rude -2	Laiteron rude -2	Laiteron rude -6		