

Exploitation : CA37
Parcelle : CBO
Type de sol : Bournais

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	26	
Vulpin	21	
Brome stérile	15	
Brome mou	23	

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Jul-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	50 gr/m²
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Brome stérile 105	Brome stérile -6	Brome stérile -1	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Brome mou 105	Brome mou -6	Brome mou -1	Brome mou 0	Brome mou 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Déc-d2 Août-d3	
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Sep-d2	Ray-grass 88
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 81
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Brome stérile 97
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 97

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d3</div> <div>Ray-grass 35</div> <div>Vulpin 35</div> <div>Brome stérile 45</div> <div>Brome mou 45</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible <div>Ray-grass -4</div> <div>Vulpin -4</div> <div>Brome stérile -4</div> <div>Brome mou -4</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Jul-d3</div> <div>Sep-d2</div> <div>Oct-d1</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Ray-grass -10</div> <div>Vulpin -11</div> <div>Brome stérile -12</div> <div>Brome mou -11</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Brome mou 0</div>	Densité de semis 200 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Brome mou 0</div>
Entre rangs 15 cm <div>Ray-grass -1</div> <div>Vulpin -1</div> <div>Brome stérile -1</div> <div>Brome mou -1</div>	Variété Moyennement couvrante <div>Ray-grass -1</div> <div>Vulpin -1</div> <div>Brome stérile -1</div> <div>Brome mou -1</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Brome mou 0</div>	Désherbage chimique <div>Nov-d2</div> <div>Oct-d3</div> <div>Mar-d3</div>	Score annuel <div>Ray-grass 19</div> <div>Vulpin 18</div> <div>Brome stérile 26</div> <div>Brome mou 28</div>

Année 3 - Tournesol

Date de semis <div>Avr-d3</div> <div>Ray-grass 12</div> <div>Vulpin 15</div> <div>Brome stérile 8</div> <div>Brome mou 8</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Brome mou 0</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Avr-d1</div> Date de semis du couvert : <div>Aoû-d1</div> Date de destruction : <div>Déc-d1</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Vulpin -2</div> <div>Brome stérile -1</div> <div>Brome mou -2</div>	Date de labour <div>Déc-d1</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Vulpin -2</div> <div>Brome stérile -3</div> <div>Brome mou -2</div>	Densité de semis 6 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Brome mou 0</div>
Entre rangs 45 cm <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Brome mou 0</div>	Variété Moyennement couvrante <div>Ray-grass -1</div> <div>Vulpin -1</div> <div>Brome stérile -1</div> <div>Brome mou -1</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Brome mou 0</div>	Désherbage chimique <div>Avr-d3</div>	Score annuel <div>Ray-grass 8</div> <div>Vulpin 10</div> <div>Brome stérile 4</div> <div>Brome mou 4</div>

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	200 gr/m²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Brome stérile 45	Brome stérile -4	Brome stérile -6	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Brome mou 45	Brome mou -4	Brome mou -6	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2 Oct-d3 Mar-d2	Ray-grass 24
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Vulpin 23
Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin 0		Brome stérile 33
Brome stérile -1	Brome stérile -1	Brome stérile 0		Brome mou 33
Brome mou -1	Brome mou -1	Brome mou 0		

Année 5 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Nov-d1	Pas de labour	300 gr/m²
Ray-grass 21	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 24	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Brome stérile 8	Brome stérile -10	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Brome mou 8	Brome mou -10	Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	Ray-grass 10
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 13
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Brome stérile 0
Brome stérile -1	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Brome mou 0
Brome mou -1	Brome mou 0	Brome mou 0		