

Exploitation : CA37
 Parcelle : CBO
 Type de sol : Bournais

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	26
Vulpin	21
Brome stérile	15
Brome mou	23

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d3 Ray-grass 96 Vulpin 89 Brome stérile 105 Brome mou 105	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Ray-grass -6 Vulpin -6 Brome stérile -6 Brome mou -6	Interculture Date des faux semis : Jul-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass -1 Vulpin 0 Brome stérile -1 Brome mou -1	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0 Brome stérile 0 Brome mou 0	Densité de semis 50 gr/m ² Ray-grass 0 Vulpin 0 Brome stérile 0 Brome mou 0
Entre rangs 15 cm Ray-grass -2 Vulpin -2 Brome stérile -2 Brome mou -2	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0 Brome stérile 0 Brome mou 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Brome stérile 0 Brome mou 0	Désherbage chimique Déc-d2 Sep-d2 Aoû-d3 Ray-grass 0 Vulpin 0 Brome stérile 0 Brome mou 0	Score annuel Ray-grass 88 Vulpin 81 Brome stérile 97 Brome mou 97

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d1 Sep-d2 Jul-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	200 gr/m ²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -11	Vulpin 0	Vulpin 0
Brome stérile 45	Brome stérile -4	Brome stérile -12	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Brome mou 45	Brome mou -4	Brome mou -11	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3 Nov-d2 Mar-d3	Ray-grass 19 Vulpin 18 Brome stérile 26 Brome mou 28
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 19	Ray-grass 19
Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 18	Vulpin 18
Brome stérile -1	Brome stérile -1	Brome stérile 0	Brome stérile 26	Brome stérile 26
Brome mou -1	Brome mou -1	Brome mou 0	Brome mou 28	Brome mou 28

Année 3 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Avr-d1 Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Déc-d1	Déc-d1	6 gr/m ²
Ray-grass 12	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0
Brome stérile 8	Brome stérile 0	Brome stérile -1	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Brome mou 8	Brome mou 0	Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3	Ray-grass 8 Vulpin 10 Brome stérile 4 Brome mou 4
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 8	Ray-grass 8
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 10	Vulpin 10
Brome stérile 0	Brome stérile -1	Brome stérile 0	Brome stérile 4	Brome stérile 4
Brome mou 0	Brome mou -1	Brome mou 0	Brome mou 4	Brome mou 4

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	200 gr/m ²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Brome stérile 45	Brome stérile -4	Brome stérile -6	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Brome mou 45	Brome mou -4	Brome mou -6	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2 Oct-d3 Mar-d2	Ray-grass 24 Vulpin 23 Brome stérile 33 Brome mou 33
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 24
Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 23
Brome stérile -1	Brome stérile -1	Brome stérile 0		Brome stérile 33
Brome mou -1	Brome mou -1	Brome mou 0		Brome mou 33

Année 5 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Nov-d1	Pas de labour	300 gr/m ²
Ray-grass 21	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 24	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Brome stérile 8	Brome stérile -10	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Brome mou 8	Brome mou -10	Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	Ray-grass 10 Vulpin 13 Brome stérile 0 Brome mou 0
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 10
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 13
Brome stérile -1	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Brome stérile 0
Brome mou -1	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 0