

Exploitation : sagaert
 Parcelle : essart
 Type de sol : limon

Commentaires :

Rotation blé - Orge h - Colza - blé - Lin en Non Labour.

La rotation est à dominante cultures d'automnes (4 années sur 5), ainsi plutôt favorable à des adventices pouvant lever à l'automne (Graminées, ici vulpins, et gaillet et coquelicot). Du travail superficiel est pratiqué régulièrement été/automne et les dates de semis sont moyennes ou modérément tardives en céréales d'hiver, ce qui se traduit notamment par un risque modéré en vulpins, moins maîtrisé mais encore "moyens" en gaillet (aux levées plus échelonnées). Le risque coquelicot est le plus élevé car ceux-ci lèvent presque autant au printemps qu'à l'automne (donc les levées se font tout les ans!), et en plus ces levées sont plus échelonnées à chaque fois. On note enfin un risque moyen en Mourons, la conséquence de sa persistance (et de son "non déstockage"), qui décuple le risque sur le système alors qu'une seule année est favorable à sa période de germination (printemps/lin).

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	31
Coquelicot	66
Gaillet	44
Mouron	43

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver				
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Aoû-d2 Sep-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	230 gr/m ²
Vulpin 35 Coquelicot 55 Gaillet 93 Mouron 2	Vulpin 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Mouron 0	Vulpin -6 Coquelicot -3 Gaillet -1 Mouron -1	Vulpin 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Mouron 0	Vulpin 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3	Vulpin 27 Coquelicot 51 Gaillet 90 Mouron 0
Vulpin -2 Coquelicot -2 Gaillet -2 Mouron -2	Vulpin 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Mouron 0	Vulpin 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Mouron 0		

Année 2 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Aoû-d2 Sep-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	230 gr/m ²
Vulpin 56 Coquelicot 59 Gaillet 95 Mouron 0	Vulpin -10 Coquelicot -10 Gaillet -10 Mouron -10	Vulpin -6 Coquelicot -3 Gaillet -1 Mouron -1	Vulpin 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Mouron 0	Vulpin 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d2	Vulpin 38 Coquelicot 45 Gaillet 82 Mouron 0
Vulpin -2 Coquelicot -2 Gaillet -2 Mouron -2	Vulpin 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Mouron 0	Vulpin 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Mouron 0		

Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Jul-d3 Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	45 gr/m ²
Vulpin 89 Coquelicot 41 Gaillet 25 Mouron 9	Vulpin -6 Coquelicot -6 Gaillet -6 Mouron -6	Vulpin -1 Coquelicot -1 Gaillet 0 Mouron -3	Vulpin 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Mouron 0	Vulpin 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Aoû-d3	Vulpin 79 Coquelicot 32 Gaillet 17 Mouron 0
Vulpin -2 Coquelicot -2 Gaillet -2 Mouron -2	Vulpin 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Mouron 0	Vulpin 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Mouron 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Aoû-d1 Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	230 gr/m ²
Vulpin 35 Coquelicot 55 Gaillet 93 Mouron 2	Vulpin -4 Coquelicot -4 Gaillet -4 Mouron -4	Vulpin -4 Coquelicot -2 Gaillet 0 Mouron -2	Vulpin 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Mouron 0	Vulpin 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3	Vulpin 25 Coquelicot 48 Gaillet 87 Mouron 0
Vulpin -2 Coquelicot -2 Gaillet -2 Mouron -2	Vulpin 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Mouron 0	Vulpin 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Mouron 0		

Année 5 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Nov-d2	Pas de labour	2100 gr/m ²
Vulpin 21 Coquelicot 38 Gaillet 2 Mouron 91	Vulpin 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Mouron 0	Vulpin 0 Coquelicot -0 Gaillet 0 Mouron -1	Vulpin 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Mouron 0	Vulpin 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2	Vulpin 21 Coquelicot 37 Gaillet 2 Mouron 89
Vulpin 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Mouron 0	Vulpin 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Mouron 0	Vulpin 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Mouron 0		