

Exploitation : brument  
 Parcelle : fontaine  
 Type de sol : limon

## Commentaires :

*ROTATION MAIS - BLE - OH type élevage. Sans Labour.*

La rotation est plutôt équilibrée (2/3 et 1/3 culture estivale) et par nature (semis "peu précoces" et rupture de cycles avec une culture estivale) permet un risque modéré sur vulpins et Ray Grass. L'agrostis levant plutôt en période froide (janv/fev.) le risque est faible. Enfin de part les levées plus échelonnées et tardives du gaillet à l'automne et le sans labour (labour qui serait efficace vu la faible persistance du gaillet), le risque très fort 2 années sur 3 a pour résultante un risque "fort" (mais tout juste) sur le système pour cette adventice.

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	34
Gaillet	52
Vulpin	35
Agrostis	20



## Situation initiale :

### Année 1 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	11 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 27 Gaillet 3 Vulpin 28 Agrostis 4	Ray-grass -6 Gaillet -6 Vulpin -6 Agrostis -6	Ray-grass -5 Gaillet 0 Vulpin -4 Agrostis -0	Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 Agrostis 0	Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 Agrostis 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 Agrostis 0	Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 Agrostis 0	Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 Agrostis 0		Ray-grass 16 Gaillet 0 Vulpin 19 Agrostis 0

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert :  Non définie Date de destruction :  Non définie	Pas de labour	250 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Agrostis 36	Agrostis -4	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 45
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 90
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 53
Agrostis -2	Agrostis -1	Agrostis 0		Agrostis 29

## Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert :  Non définie Date de destruction :  Non définie	Pas de labour	200 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 48	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 56	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Agrostis 28	Agrostis -4	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 41
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 88
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 49
Agrostis -2	Agrostis -1	Agrostis 0		Agrostis 21