

## Commentaires :

Dans le scénario testé, pas de modifications de rotation et quelques décalage de semis modéré permettent d'abaisser légèrement les risques moyens mais finalement pas à un niveau raisonnable pour la pensée des champs. Résultat logique car la date de semis n'est pas efficace sur cette adventice à levées assez échelonnées aux printemps et à l'automne (tout comme la rotation a un effet très aléatoire sur celle ci). Intensifier les déchaumages et faux semis dans les règles de l'art est certainement le plus efficace, pour réussir à abaisser le stock et surtout le risque au moins 1 à 2 années sur les 3 concernées dans le systèmes.(blés par exemple)

Scénario : DOUBLET 2  
Exploitation : DOUBLET  
Parcelle : les 13 ha  
Type de sol : limoneux argileu

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Gaillet	23 ( 32)
Folle-avoine	15 ( 22)
Ray-grass	23 ( 34)
Pensée des champs	66 ( 76)
Vulpin	15 ( 28)

## Scénario :

### Année 1 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> Nov-d1 Gaillet 84 Folle-avoine 15 Ray-grass 18 Pensée des champs 62 Vulpin 14	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Faible Gaillet -4 Folle-avoine -4 Ray-grass -4 Pensée des champs -4 Vulpin -4	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Oct-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Gaillet -5 Folle-avoine -1 Ray-grass -4 Pensée des champs -2 Vulpin -5	<b>Date de labour</b> Oct-d3 Gaillet -17 Folle-avoine -8 Ray-grass -10 Pensée des champs -4 Vulpin -14	<b>Densité de semis</b> 260 gr/m <sup>2</sup> Gaillet 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Pensée des champs 0 Vulpin 0
<b>Entre rangs</b> 12 cm Gaillet -2 Folle-avoine -2 Ray-grass -2 Pensée des champs -2 Vulpin -2	<b>Variété</b> Très couvrante Gaillet -2 Folle-avoine -2 Ray-grass -2 Pensée des champs -2 Vulpin -2	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Gaillet 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Pensée des champs 0 Vulpin 0	<b>Désherbage chimique</b> Mar-d1	<b>Score annuel</b> Gaillet 55 Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Pensée des champs 47 Vulpin 0

## Année 2 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Avr-d1</b> Gaillet 3 Folle-avoine 69 Ray-grass 27 Pensée des champs 42 Vulpin 28	Association de cultures : Aucune Très faible Gaillet 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Pensée des champs 0 Vulpin 0	Date des faux semis : <b>Aoû-d3</b> Date de semis du couvert : <b>Sep-d1</b> Date de destruction : <b>Déc-d2</b> Gaillet 0 Folle-avoine -1 Ray-grass -4 Pensée des champs -0 Vulpin -3	<b>Jan-d2</b> Gaillet -11 Folle-avoine -7 Ray-grass -6 Pensée des champs -3 Vulpin -10	350 gr/m² Gaillet 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Pensée des champs 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
6 cm Gaillet 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Pensée des champs 0 Vulpin 0	Non couvrante Gaillet 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Pensée des champs 0 Vulpin 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Gaillet 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Pensée des champs 0 Vulpin 0	<b>Mar-d3</b>	Gaillet 0 Folle-avoine 61 Ray-grass 17 Pensée des champs 39 Vulpin 16

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Oct-d3</b> Gaillet 93 Folle-avoine 20 Ray-grass 35 Pensée des champs 64 Vulpin 35	Association de cultures : Aucune Faible Gaillet -4 Folle-avoine -4 Ray-grass -4 Pensée des champs -4 Vulpin -4	Date des faux semis : <b>Sep-d1</b> Date de semis du couvert : <b>Non définie</b> Date de destruction : <b>Non définie</b> Gaillet 0 Folle-avoine -1 Ray-grass -5 Pensée des champs -0 Vulpin -4	<b>Oct-d3</b> Gaillet -17 Folle-avoine -8 Ray-grass -10 Pensée des champs -4 Vulpin -14	260 gr/m² Gaillet 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Pensée des champs 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm Gaillet -2 Folle-avoine -2 Ray-grass -2 Pensée des champs -2 Vulpin -2	Très couvrante Gaillet -2 Folle-avoine -2 Ray-grass -2 Pensée des champs -2 Vulpin -2	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Gaillet 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Pensée des champs 0 Vulpin 0	<b>Mar-d2</b>	Gaillet 69 Folle-avoine 3 Ray-grass 12 Pensée des champs 52 Vulpin 10

## Année 4 - Colza d'hiver

### Date de semis

Août-d2

Gaillet	13
Folle-avoine	22
Ray-grass	88
Pensée des champs	9
Vulpin	68

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Aucune  
Moyen

Gaillet	-6
Folle-avoine	-6
Ray-grass	-6
Pensée des champs	-6
Vulpin	-6

### Interculture

Date des faux semis :  
Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Gaillet	0
Folle-avoine	0
Ray-grass	0
Pensée des champs	0
Vulpin	0

### Date de labour

Pas de labour

Gaillet	0
Folle-avoine	0
Ray-grass	0
Pensée des champs	0
Vulpin	0

### Densité de semis

25 gr/m²

Gaillet	0
Folle-avoine	0
Ray-grass	0
Pensée des champs	0
Vulpin	0

### Entre rangs

12 cm

Gaillet	-2
Folle-avoine	-2
Ray-grass	-2
Pensée des champs	-2
Vulpin	-2

### Variété

Moyennement couvrante

Gaillet	-1
Folle-avoine	-1
Ray-grass	-1
Pensée des champs	-1
Vulpin	-1

### Désherbage mécanique

Bineuse :  
Houe rotative :  
Herse étrille :

Gaillet	0
Folle-avoine	0
Ray-grass	0
Pensée des champs	0
Vulpin	0

### Désherbage chimique

Août-d3

### Score annuel

Gaillet	4
Folle-avoine	13
Ray-grass	79
Pensée des champs	0
Vulpin	59