

Exploitation : Digifirme S2
Parcelle : P31
Type de sol : limono-argileux fin

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	12
Brome stérile	5
Gaillet	25
Laiteron rude	32
Séneçon vulgaire	41

Situation initiale :

Année 1 - Féverole d'hiver

Date de semis Nov-d2 Ray-grass 4 Brome stérile 5 Gaillet 72 Laiteron rude 20 Séneçon vulgaire 29	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4 Brome stérile -4 Gaillet -4 Laiteron rude -4 Séneçon vulgaire -4	Interculture Date des faux semis : Sep-d3 Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass -7 Brome stérile -8 Gaillet -3 Laiteron rude -2 Séneçon vulgaire -2	Date de labour Nov-d2 Ray-grass -4 Brome stérile -6 Gaillet -8 Laiteron rude -2 Séneçon vulgaire -3	Densité de semis 30 gr/m² Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Séneçon vulgaire 0
Entre rangs 15 cm Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Séneçon vulgaire 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Séneçon vulgaire 0	Désherbage mécanique Bineuse : Avr-d1 Mar-d2 Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass -4 Brome stérile -2 Gaillet -1 Laiteron rude -3 Séneçon vulgaire -3	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 58 Laiteron rude 9 Séneçon vulgaire 17

Année 2 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2 Ray-grass 19 Brome stérile 11 Gaillet 2 Laiteron rude 57 Séneçon vulgaire 53	Association de cultures : Aucune Moyen Ray-grass -6 Brome stérile -6 Gaillet -6 Laiteron rude -6 Séneçon vulgaire -6	Date des faux semis : Aoû-d3 Jul-d3 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Avr-d1 Ray-grass -5 Brome stérile -5 Gaillet 0 Laiteron rude -2 Séneçon vulgaire -2	Avr-d2 Ray-grass -4 Brome stérile -6 Gaillet -4 Laiteron rude -2 Séneçon vulgaire -3	7.5 gr/m² Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Séneçon vulgaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Séneçon vulgaire 0	Moyennement couvrante Ray-grass -1 Brome stérile -1 Gaillet -1 Laiteron rude -1 Séneçon vulgaire -1	Bineuse : Mai-d3 Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass -1 Brome stérile -1 Gaillet 0 Laiteron rude -6 Séneçon vulgaire -5		Ray-grass 3 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 40 Séneçon vulgaire 36

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1 Ray-grass 18 Brome stérile 21 Gaillet 84 Laiteron rude 26 Séneçon vulgaire 36	Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4 Brome stérile -4 Gaillet -4 Laiteron rude -4 Séneçon vulgaire -4	Date des faux semis : Oct-d1 Jul-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass -5 Brome stérile -7 Gaillet -4 Laiteron rude -3 Séneçon vulgaire -3	Pas de labour Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Séneçon vulgaire 0	350 gr/m² Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Séneçon vulgaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm Ray-grass -1 Brome stérile -1 Gaillet -1 Laiteron rude -1 Séneçon vulgaire -1	Non couvrante Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Séneçon vulgaire 0	Bineuse : Avr-d3 Mar-d3 Mar-d2 Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2 Ray-grass -5 Brome stérile -2 Gaillet -1 Laiteron rude -6 Séneçon vulgaire -6		Ray-grass 3 Brome stérile 7 Gaillet 74 Laiteron rude 12 Séneçon vulgaire 23

Année 4 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1 Ray-grass 97 Brome stérile 115 Gaillet 42 Laiteron rude 21 Séneçon vulgaire 30	Association de cultures : Aucune Fort Ray-grass -10 Brome stérile -10 Gaillet -10 Laiteron rude -10 Séneçon vulgaire -10	Date des faux semis : Oct-d1 Sep-d1 Aoû-d1 Jul-d2 Mar-d1 Fév-d1 Jan-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass -12 Brome stérile -13 Gaillet -8 Laiteron rude -6 Séneçon vulgaire -7	Pas de labour Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Séneçon vulgaire 0	235 gr/m² Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Séneçon vulgaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Séneçon vulgaire 0	Très couvrante Ray-grass -2 Brome stérile -2 Gaillet -2 Laiteron rude -2 Séneçon vulgaire -2	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Séneçon vulgaire 0		Ray-grass 73 Brome stérile 90 Gaillet 22 Laiteron rude 3 Séneçon vulgaire 11

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1 Ray-grass 18 Brome stérile 21 Gaillet 84 Laiteron rude 26 Séneçon vulgaire 36	Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4 Brome stérile -4 Gaillet -4 Laiteron rude -4 Séneçon vulgaire -4	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Séneçon vulgaire 0	Nov-d1 Ray-grass -4 Brome stérile -8 Gaillet -8 Laiteron rude -2 Séneçon vulgaire -3	350 gr/m² Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Séneçon vulgaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm Ray-grass -1 Brome stérile -1 Gaillet -1 Laiteron rude -1 Séneçon vulgaire -1	Non couvrante Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Séneçon vulgaire 0	Bineuse : Mar-d3 Houe rotative : Herse étrille : Mar-d3 Ray-grass -2 Brome stérile -1 Gaillet -0 Laiteron rude -2 Séneçon vulgaire -2		Ray-grass 7 Brome stérile 7 Gaillet 71 Laiteron rude 17 Séneçon vulgaire 27

Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis

Mar-d2

Ray-grass	35
Brome stérile	16
Gaillet	5
Laiteron rude	38
Séneçon vulgaire	40

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Moyen

Ray-grass	-6
Brome stérile	-6
Gaillet	-6
Laiteron rude	-6
Séneçon vulgaire	-6

Interculture

Date des faux semis :

Jan-d1 Oct-d1 Sep-d1
Août-d1 Jul-d2 Mar-d1

Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Ray-grass	-12
Brome stérile	-13
Gaillet	-7
Laiteron rude	-6
Séneçon vulgaire	-6

Date de labour

Pas de labour

Ray-grass	0
Brome stérile	0
Gaillet	0
Laiteron rude	0
Séneçon vulgaire	0

Densité de semis

310 gr/m²

Ray-grass	0
Brome stérile	0
Gaillet	0
Laiteron rude	0
Séneçon vulgaire	0

Entre rangs

15 cm

Ray-grass	-1
Brome stérile	-1
Gaillet	-1
Laiteron rude	-1
Séneçon vulgaire	-1

Variété

Moyennement couvrante

Ray-grass	-1
Brome stérile	-1
Gaillet	-1
Laiteron rude	-1
Séneçon vulgaire	-1

Désherbage mécanique

Bineuse :

Avr-d2

Houe rotative :

Herse étrille :

Avr-d2 Mar-d3

Ray-grass	-5
Brome stérile	-2
Gaillet	-1
Laiteron rude	-6
Séneçon vulgaire	-6

Désherbage chimique

Score annuel

Ray-grass	9
Brome stérile	0
Gaillet	0
Laiteron rude	18
Séneçon vulgaire	19