

Scénario : scénario 2
 Exploitation : Digiferme S2
 Parcelle : P31
 Type de sol : limono-argileux fin

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	10 (2)
Brome stérile	4 (0)
Gaillet	13 (10)
Laiteron rude	28 (28)

Scénario :

Année 1 - Féverole d'hiver

Date de semis	Étoffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Aoû-d1 Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Nov-d2	225 gr/m ²
Ray-grass 4	Ray-grass -4	Ray-grass -7	Ray-grass -7	Ray-grass 0
Brome stérile 5	Brome stérile -4	Brome stérile -8	Brome stérile -13	Brome stérile 0
Gaillet 72	Gaillet -4	Gaillet -3	Gaillet -15	Gaillet 0
Laiteron rude 20	Laiteron rude -4	Laiteron rude -2	Laiteron rude -3	Laiteron rude 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d1 Mar-d2 Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -4		Ray-grass 0
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile -2		Brome stérile 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -1		Gaillet 50
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude -3		Laiteron rude 8

Année 2 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Jul-d3 Aoû-d3 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Avr-d1	Avr-d2	7.5 gr/m ²
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Ray-grass -8	Ray-grass 0
Brome stérile 11	Brome stérile 0	Brome stérile -5	Brome stérile -13	Brome stérile 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -9	Gaillet 0
Laiteron rude 57	Laiteron rude 0	Laiteron rude -2	Laiteron rude -4	Laiteron rude 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Mai-d3 Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass -1		Ray-grass 5
Brome stérile 0	Brome stérile -1	Brome stérile -1		Brome stérile 0
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 0
Laiteron rude 0	Laiteron rude -1	Laiteron rude -6		Laiteron rude 44

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Jul-d3 Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	340 gr/m ²
Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome stérile 0	Brome stérile -4	Brome stérile -7	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Laiteron rude 0	Laiteron rude -4	Laiteron rude -3	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d3 Avr-d2 Houe rotative : Herse étrille : Avr-d2 Avr-d3		
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass -6		Ray-grass 0
Brome stérile -1	Brome stérile 0	Brome stérile -3		Brome stérile 0
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet -1		Gaillet 0
Laiteron rude -1	Laiteron rude 0	Laiteron rude -10		Laiteron rude 0

Année 4 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Jan-d1 Fév-d1 Mar-d1 Avr-d1 Jul-d2 Aoû-d1 Sep-d1 Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	280 gr/m ²
Ray-grass 97	Ray-grass -10	Ray-grass -14	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome stérile 115	Brome stérile -10	Brome stérile -14	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Gaillet 42	Gaillet -10	Gaillet -8	Gaillet 0	Gaillet 0
Laiteron rude 21	Laiteron rude -10	Laiteron rude -8	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0		Ray-grass 71
Brome stérile 0	Brome stérile -2	Brome stérile 0		Brome stérile 90
Gaillet 0	Gaillet -2	Gaillet 0		Gaillet 22
Laiteron rude 0	Laiteron rude -2	Laiteron rude 0		Laiteron rude 1

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Nov-d1	391 gr/m ²
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -9	Ray-grass -2
Brome stérile 21	Brome stérile -4	Brome stérile 0	Brome stérile -16	Brome stérile -2
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -16	Gaillet -2
Laiteron rude 26	Laiteron rude -4	Laiteron rude 0	Laiteron rude -3	Laiteron rude -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Mar-d3 Houe rotative : Herse étrille : Mar-d3		
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass -2		Ray-grass 1
Brome stérile -1	Brome stérile 0	Brome stérile -1		Brome stérile 0
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet -0		Gaillet 61
Laiteron rude -1	Laiteron rude 0	Laiteron rude -2		Laiteron rude 14

Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Oct-d1 Sep-d1 Aoû-d1 Jul-d2 Mar-d1 Jan-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	420 gr/m ²
Ray-grass 35	Ray-grass -6	Ray-grass -12	Ray-grass 0	Ray-grass -2
Brome stérile 16	Brome stérile -6	Brome stérile -13	Brome stérile 0	Brome stérile -2
Gaillet 5	Gaillet -6	Gaillet -7	Gaillet 0	Gaillet -2
Laiteron rude 38	Laiteron rude -6	Laiteron rude -6	Laiteron rude 0	Laiteron rude -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Avr-d1 Houe rotative : Herse étrille : Mar-d3 Avr-d1		Ray-grass 7
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass -6		Brome stérile 0
Brome stérile -1	Brome stérile -1	Brome stérile -2		Gaillet 0
Gaillet -1	Gaillet -1	Gaillet -1		Laiteron rude 17
Laiteron rude -1	Laiteron rude -1	Laiteron rude -6		