

Scénario : Nouveau scénario
Exploitation : Digifirme S2
Parcelle : P31
Type de sol : limono-argileux fin

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	13 (13)
Brome stérile	5 (5)
Gaillet	25 (25)
Laiteron rude	33 (33)

Scénario :

Année 1 - Féverole d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Aoû-d1 Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Nov-d2	225 gr/m²
Ray-grass 4	Ray-grass -4	Ray-grass -7	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Brome stérile 5	Brome stérile -4	Brome stérile -8	Brome stérile -6	Brome stérile 0
Gaillet 72	Gaillet -4	Gaillet -3	Gaillet -8	Gaillet 0
Laiteron rude 20	Laiteron rude -4	Laiteron rude -2	Laiteron rude -2	Laiteron rude 0
Entre rangs	Variété	Dés herbage mécanique	Dés herbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Mar-d2 Avr-d1 Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -4		Ray-grass 0
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile -2		Brome stérile 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -1		Gaillet 58
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude -3		Laiteron rude 9

Année 2 - Tournesol

Date de semis Avr-d2 Ray-grass 19 Brome stérile 11 Gaillet 2 Laiteron rude 57	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0	Interculture Date des faux semis : Jul-d3 Août-d3 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Avr-d1 Ray-grass -5 Brome stérile -5 Gaillet 0 Laiteron rude -2	Date de labour Avr-d2 Ray-grass -4 Brome stérile -6 Gaillet -4 Laiteron rude -2	Densité de semis 7.5 gr/m² Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0
Entre rangs 75 cm Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0	Variété Moyennement couvrante Ray-grass -1 Brome stérile -1 Gaillet -1 Laiteron rude -1	Désherbage mécanique Bineuse : Mai-d1 Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass -1 Brome stérile -1 Gaillet 0 Laiteron rude -6	Désherbage chimique 	Score annuel Ray-grass 9 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 46

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis Nov-d1 Ray-grass 18 Brome stérile 21 Gaillet 84 Laiteron rude 26	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4 Brome stérile -4 Gaillet -4 Laiteron rude -4	Interculture Date des faux semis : Jul-d3 Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass -5 Brome stérile -7 Gaillet -4 Laiteron rude -3	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0	Densité de semis 340 gr/m² Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0
Entre rangs 15 cm Ray-grass -1 Brome stérile -1 Gaillet -1 Laiteron rude -1	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0	Désherbage mécanique Bineuse : Avr-d2 Avr-d3 Houe rotative : Herse étrille : Avr-d2 Avr-d3 Ray-grass -3 Brome stérile -2 Gaillet -0 Laiteron rude -5	Désherbage chimique 	Score annuel Ray-grass 5 Brome stérile 8 Gaillet 75 Laiteron rude 13

Année 4 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Jan-d1 Fév-d1 Mar-d1 Avr-d1 Jul-d2 Aoû-d1 Sep-d1 Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	280 gr/m²
Ray-grass 97	Ray-grass -10	Ray-grass -14	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome stérile 115	Brome stérile -10	Brome stérile -14	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Gaillet 42	Gaillet -10	Gaillet -8	Gaillet 0	Gaillet 0
Laiteron rude 21	Laiteron rude -10	Laiteron rude -8	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 71
Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0		Brome stérile 90
Brome stérile 0	Brome stérile -2	Brome stérile 0		Gaillet 22
Gaillet 0	Gaillet -2	Gaillet 0		Laiteron rude 1
Laiteron rude 0	Laiteron rude -2	Laiteron rude 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Nov-d1	391 gr/m²
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass -2
Brome stérile 21	Brome stérile -4	Brome stérile 0	Brome stérile -8	Brome stérile -2
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -8	Gaillet -2
Laiteron rude 26	Laiteron rude -4	Laiteron rude 0	Laiteron rude -2	Laiteron rude -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Mar-d3 Houe rotative : Herse étrille : Mar-d3		Ray-grass 5
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass -2		Brome stérile 5
Brome stérile -1	Brome stérile 0	Brome stérile -1		Gaillet 69
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet -0		Laiteron rude 15
Laiteron rude -1	Laiteron rude 0	Laiteron rude -2		

Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis

Mar-d2

Ray-grass 35

Brome stérile 16

Gaillet 5

Laiteron rude 38

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Moyen

Ray-grass -6

Brome stérile -6

Gaillet -6

Laiteron rude -6

Interculture

Date des faux semis :

Mar-d1

Jul-d2

Août-d1

Sep-d1

Oct-d1

Jan-d1

Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Ray-grass -12

Brome stérile -13

Gaillet -7

Laiteron rude -6

Date de labour

Pas de labour

Ray-grass 0

Brome stérile 0

Gaillet 0

Laiteron rude 0

Densité de semis

420 gr/m²

Ray-grass -2

Brome stérile -2

Gaillet -2

Laiteron rude -2

Entre rangs

15 cm

Ray-grass -1

Brome stérile -1

Gaillet -1

Laiteron rude -1

Variété

Moyennement couvrante

Ray-grass -1

Brome stérile -1

Gaillet -1

Laiteron rude -1

Désherbage mécanique

Bineuse :

Avr-d1

Houe rotative :

Herse étrille :

Mar-d3

Avr-d1

Ray-grass -6

Brome stérile -2

Gaillet -1

Laiteron rude -6

Désherbage chimique

Score annuel

Ray-grass 7

Brome stérile 0

Gaillet 0

Laiteron rude 17