

Scénario : Nouveau scénario  
Exploitation : Digifirme S2  
Parcelle : P31  
Type de sol : limono-argileux fin

Commentaires :

  

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	13 ( 13 )	
Brome stérile	5 ( 5 )	
Gaillet	25 ( 25 )	
Laiteron rude	33 ( 33 )	

## Scénario :

### Année 1 - Féverole d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Aoû-d1 Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Nov-d2	225 gr/m²
Ray-grass 4	Ray-grass -4	Ray-grass -7	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Brome stérile 5	Brome stérile -4	Brome stérile -8	Brome stérile -6	Brome stérile 0
Gaillet 72	Gaillet -4	Gaillet -3	Gaillet -8	Gaillet 0
Laiteron rude 20	Laiteron rude -4	Laiteron rude -2	Laiteron rude -2	Laiteron rude 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Mar-d2 Avr-d1 Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -4		Ray-grass 0
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile -2		Brome stérile 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -1		Gaillet 58
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude -3		Laiteron rude 9

## Année 2 - Tournesol

<b>Date de semis</b> <div>Avr-d2</div> <div>Ray-grass 19</div> <div>Brome stérile 11</div> <div>Gaillet 2</div> <div>Laiteron rude 57</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Très faible <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Laiteron rude 0</div>	<b>Interculture</b> Date des faux semis : <div>Jul-d3</div> <div>Août-d3</div> Date de semis du couvert : <div>Sep-d1</div> Date de destruction : <div>Avr-d1</div> <div>Ray-grass -5</div> <div>Brome stérile -5</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Laiteron rude -2</div>	<b>Date de labour</b> <div>Avr-d2</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Brome stérile -6</div> <div>Gaillet -4</div> <div>Laiteron rude -2</div>	<b>Densité de semis</b> 7.5 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Laiteron rude 0</div>
<b>Entre rangs</b> 75 cm <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Laiteron rude 0</div>	<b>Variété</b> Moyennement couvrante <div>Ray-grass -1</div> <div>Brome stérile -1</div> <div>Gaillet -1</div> <div>Laiteron rude -1</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : <div>Mai-d1</div> <div>Mai-d3</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass -1</div> <div>Brome stérile -1</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Laiteron rude -6</div>	<b>Désherbage chimique</b> 	<b>Score annuel</b> <div>Ray-grass 9</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Laiteron rude 46</div>

## Année 3 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> <div>Nov-d1</div> <div>Ray-grass 18</div> <div>Brome stérile 21</div> <div>Gaillet 84</div> <div>Laiteron rude 26</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Faible <div>Ray-grass -4</div> <div>Brome stérile -4</div> <div>Gaillet -4</div> <div>Laiteron rude -4</div>	<b>Interculture</b> Date des faux semis : <div>Jul-d3</div> <div>Oct-d1</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Ray-grass -5</div> <div>Brome stérile -7</div> <div>Gaillet -4</div> <div>Laiteron rude -3</div>	<b>Date de labour</b> <div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Laiteron rude 0</div>	<b>Densité de semis</b> 340 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Laiteron rude 0</div>
<b>Entre rangs</b> 15 cm <div>Ray-grass -1</div> <div>Brome stérile -1</div> <div>Gaillet -1</div> <div>Laiteron rude -1</div>	<b>Variété</b> Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Laiteron rude 0</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : <div>Avr-d2</div> <div>Avr-d3</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Avr-d2</div> <div>Avr-d3</div> <div>Ray-grass -3</div> <div>Brome stérile -2</div> <div>Gaillet -0</div> <div>Laiteron rude -5</div>	<b>Désherbage chimique</b> 	<b>Score annuel</b> <div>Ray-grass 5</div> <div>Brome stérile 8</div> <div>Gaillet 75</div> <div>Laiteron rude 13</div>

## Année 4 - Luzerne

<b>Date de semis</b> Sep-d1 Ray-grass 97 Brome stérile 115 Gaillet 42 Laiteron rude 21	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Fort Ray-grass -10 Brome stérile -10 Gaillet -10 Laiteron rude -10	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Jan-d1 Fév-d1 Mar-d1 Avr-d1 Jul-d2 Aoû-d1 Sep-d1 Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass -14 Brome stérile -14 Gaillet -8 Laiteron rude -8	<b>Date de labour</b> Pas de labour Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0	<b>Densité de semis</b> 280 gr/m² Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0
<b>Entre rangs</b> Non défini Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0	<b>Variété</b> Très couvrante Ray-grass -2 Brome stérile -2 Gaillet -2 Laiteron rude -2	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Ray-grass 71 Brome stérile 90 Gaillet 22 Laiteron rude 1

## Année 5 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> Nov-d1 Ray-grass 18 Brome stérile 21 Gaillet 84 Laiteron rude 26	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4 Brome stérile -4 Gaillet -4 Laiteron rude -4	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0	<b>Date de labour</b> Nov-d1 Ray-grass -4 Brome stérile -8 Gaillet -8 Laiteron rude -2	<b>Densité de semis</b> 391 gr/m² Ray-grass -2 Brome stérile -2 Gaillet -2 Laiteron rude -2
<b>Entre rangs</b> 15 cm Ray-grass -1 Brome stérile -1 Gaillet -1 Laiteron rude -1	<b>Variété</b> Non couvrante Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Mar-d3 Houe rotative : Herse étrille : Mar-d3 Ray-grass -2 Brome stérile -1 Gaillet -0 Laiteron rude -2	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Ray-grass 5 Brome stérile 5 Gaillet 69 Laiteron rude 15

## Année 6 - Orge d'hiver

### Date de semis

Mar-d2

Ray-grass 35

Brome stérile 16

Gaillet 5

Laiteron rude 38

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Aucune  
Moyen

Ray-grass -6

Brome stérile -6

Gaillet -6

Laiteron rude -6

### Interculture

Date des faux semis :

Mar-d1

Jul-d2

Août-d1

Sep-d1

Oct-d1

Jan-d1

Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Ray-grass -12

Brome stérile -13

Gaillet -7

Laiteron rude -6

### Date de labour

Pas de labour

Ray-grass 0

Brome stérile 0

Gaillet 0

Laiteron rude 0

### Densité de semis

420 gr/m²

Ray-grass -2

Brome stérile -2

Gaillet -2

Laiteron rude -2

### Entre rangs

15 cm

Ray-grass -1

Brome stérile -1

Gaillet -1

Laiteron rude -1

### Variété

Moyennement couvrante

Ray-grass -1

Brome stérile -1

Gaillet -1

Laiteron rude -1

### Désherbage mécanique

Bineuse :

Avr-d1

Houe rotative :

Herse étrille :

Mar-d3

Avr-d1

Ray-grass -6

Brome stérile -2

Gaillet -1

Laiteron rude -6

### Désherbage chimique

### Score annuel

Ray-grass 7

Brome stérile 0

Gaillet 0

Laiteron rude 17