

Scénario : Nouveau scénario  
Exploitation : Digifirme S2  
Parcelle : P31  
Type de sol : limono-argileux fin

Commentaires :

  

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	12 ( 12)
Brome stérile	5 ( 5)
Gaillet	25 ( 25)
Laiteron rude	32 ( 32)
Séneçon vulgaire	41 ( 41)

## Scénario :

### Année 1 - Féverole d'hiver

<b>Date de semis</b> Nov-d2 Ray-grass 4 Brome stérile 5 Gaillet 72 Laiteron rude 20 Séneçon vulgaire 29	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4 Brome stérile -4 Gaillet -4 Laiteron rude -4 Séneçon vulgaire -4	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Aoû-d1 Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass -7 Brome stérile -8 Gaillet -3 Laiteron rude -2 Séneçon vulgaire -2	<b>Date de labour</b> Nov-d2 Ray-grass -4 Brome stérile -6 Gaillet -8 Laiteron rude -2 Séneçon vulgaire -3	<b>Densité de semis</b> 30 gr/m² Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Séneçon vulgaire 0
<b>Entre rangs</b> 15 cm Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Séneçon vulgaire 0	<b>Variété</b> Non couvrante Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Séneçon vulgaire 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Mar-d2 Avr-d1 Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass -4 Brome stérile -2 Gaillet -1 Laiteron rude -3 Séneçon vulgaire -3	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 58 Laiteron rude 9 Séneçon vulgaire 17

## Année 2 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Avr-d2</p> <p>Ray-grass 19</p> <p>Brome stérile 11</p> <p>Gaillet 2</p> <p>Laiteron rude 57</p> <p>Séneçon vulgaire 53</p>	<p>Association de cultures : Aucune Moyen</p> <p>Ray-grass -6</p> <p>Brome stérile -6</p> <p>Gaillet -6</p> <p>Laiteron rude -6</p> <p>Séneçon vulgaire -6</p>	<p>Date des faux semis : Aoû-d3 Jul-d3</p> <p>Date de semis du couvert : Sep-d1</p> <p>Date de destruction : Avr-d1</p> <p>Ray-grass -5</p> <p>Brome stérile -5</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Laiteron rude -2</p> <p>Séneçon vulgaire -2</p>	<p>Avr-d2</p> <p>Ray-grass -4</p> <p>Brome stérile -6</p> <p>Gaillet -4</p> <p>Laiteron rude -2</p> <p>Séneçon vulgaire -3</p>	<p>7.5 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>50 cm</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p>	<p>Moyennement couvrante</p> <p>Ray-grass -1</p> <p>Brome stérile -1</p> <p>Gaillet -1</p> <p>Laiteron rude -1</p> <p>Séneçon vulgaire -1</p>	<p>Bineuse : Mai-d1 Mai-d3</p> <p>Houe rotative :</p> <p>Herse étrille :</p> <p>Ray-grass -1</p> <p>Brome stérile -1</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Laiteron rude -6</p> <p>Séneçon vulgaire -5</p>		<p>Ray-grass 3</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Laiteron rude 40</p> <p>Séneçon vulgaire 36</p>

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Nov-d1</p> <p>Ray-grass 18</p> <p>Brome stérile 21</p> <p>Gaillet 84</p> <p>Laiteron rude 26</p> <p>Séneçon vulgaire 36</p>	<p>Association de cultures : Aucune Faible</p> <p>Ray-grass -4</p> <p>Brome stérile -4</p> <p>Gaillet -4</p> <p>Laiteron rude -4</p> <p>Séneçon vulgaire -4</p>	<p>Date des faux semis : Oct-d1 Jul-d3</p> <p>Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Ray-grass -5</p> <p>Brome stérile -7</p> <p>Gaillet -4</p> <p>Laiteron rude -3</p> <p>Séneçon vulgaire -3</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p>	<p>350 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>15 cm</p> <p>Ray-grass -1</p> <p>Brome stérile -1</p> <p>Gaillet -1</p> <p>Laiteron rude -1</p> <p>Séneçon vulgaire -1</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p>	<p>Bineuse : Mar-d2 Mar-d3</p> <p>Avr-d3</p> <p>Houe rotative :</p> <p>Herse étrille : Mar-d2</p> <p>Ray-grass -5</p> <p>Brome stérile -2</p> <p>Gaillet -1</p> <p>Laiteron rude -6</p> <p>Séneçon vulgaire -6</p>		<p>Ray-grass 3</p> <p>Brome stérile 7</p> <p>Gaillet 74</p> <p>Laiteron rude 12</p> <p>Séneçon vulgaire 23</p>

## Année 4 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Oct-d1 Sep-d1 Aoû-d1 Jul-d2 Mar-d1 Fév-d1 Jan-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	235 gr/m²
Ray-grass 97	Ray-grass -10	Ray-grass -12	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome stérile 115	Brome stérile -10	Brome stérile -13	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Gaillet 42	Gaillet -10	Gaillet -8	Gaillet 0	Gaillet 0
Laiteron rude 21	Laiteron rude -10	Laiteron rude -6	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Séneçon vulgaire 30	Séneçon vulgaire -10	Séneçon vulgaire -7	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 73
Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0		Brome stérile 90
Brome stérile 0	Brome stérile -2	Brome stérile 0		Gaillet 22
Gaillet 0	Gaillet -2	Gaillet 0		Laiteron rude 3
Laiteron rude 0	Laiteron rude -2	Laiteron rude 0		Séneçon vulgaire 11
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire 0		

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Nov-d1	350 gr/m²
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Brome stérile 21	Brome stérile -4	Brome stérile 0	Brome stérile -8	Brome stérile 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -8	Gaillet 0
Laiteron rude 26	Laiteron rude -4	Laiteron rude 0	Laiteron rude -2	Laiteron rude 0
Séneçon vulgaire 36	Séneçon vulgaire -4	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -3	Séneçon vulgaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Mar-d3 Houe rotative : Herse étrille : Mar-d3		Ray-grass 7
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass -2		Brome stérile 7
Brome stérile -1	Brome stérile 0	Brome stérile -1		Gaillet 71
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet -0		Laiteron rude 17
Laiteron rude -1	Laiteron rude 0	Laiteron rude -2		Séneçon vulgaire 27
Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -2		

## Année 6 - Orge d'hiver

### Date de semis

Mar-d2

Ray-grass	35
Brome stérile	16
Gaillet	5
Laiteron rude	38
Séneçon vulgaire	40

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Aucune  
Moyen

Ray-grass	-6
Brome stérile	-6
Gaillet	-6
Laiteron rude	-6
Séneçon vulgaire	-6

### Interculture

Date des faux semis :

Jan-d1 Oct-d1 Sep-d1  
Août-d1 Jul-d2 Mar-d1

Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Ray-grass	-12
Brome stérile	-13
Gaillet	-7
Laiteron rude	-6
Séneçon vulgaire	-6

### Date de labour

Pas de labour

Ray-grass	0
Brome stérile	0
Gaillet	0
Laiteron rude	0
Séneçon vulgaire	0

### Densité de semis

310 gr/m²

Ray-grass	0
Brome stérile	0
Gaillet	0
Laiteron rude	0
Séneçon vulgaire	0

### Entre rangs

15 cm

Ray-grass	-1
Brome stérile	-1
Gaillet	-1
Laiteron rude	-1
Séneçon vulgaire	-1

### Variété

Moyennement couvrante

Ray-grass	-1
Brome stérile	-1
Gaillet	-1
Laiteron rude	-1
Séneçon vulgaire	-1

### Désherbage mécanique

Bineuse :

Avr-d2

Houe rotative :

Herse étrille :

Mar-d3 Avr-d2

Ray-grass	-5
Brome stérile	-2
Gaillet	-1
Laiteron rude	-6
Séneçon vulgaire	-6

### Désherbage chimique

### Score annuel

Ray-grass	9
Brome stérile	0
Gaillet	0
Laiteron rude	18
Séneçon vulgaire	19