






Exploitation : Digifirme BG
Parcelle : 31
Type de sol : limon argileux fin

Commentaires :

Descriptif ITK du dispositif SCV dans Systerre de la campagne 2016 à 2020

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	33 
Brome stérile	22 
Gaillet	46 
Laiteron rude	30 
Séneçon vulgaire	48 

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Août-d3 Ray-grass 96 Brome stérile 105 Gaillet 25 Laiteron rude 19 Séneçon vulgaire 25	Étouffement culture Association de cultures : Autre culture d'hiver Fort Ray-grass -10 Brome stérile -10 Gaillet -10 Laiteron rude -10 Séneçon vulgaire -10	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Août-d3 Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Séneçon vulgaire 0	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Séneçon vulgaire 0	Densité de semis 600 gr/m² Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Séneçon vulgaire 0
Entre rangs 15 cm Ray-grass -2 Brome stérile -2 Gaillet -2 Laiteron rude -2 Séneçon vulgaire -2	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Séneçon vulgaire 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Séneçon vulgaire 0	Désherbage chimique Nov-d3 Août-d2 Sep-d3	Score annuel Ray-grass 84 Brome stérile 93 Gaillet 13 Laiteron rude 7 Séneçon vulgaire 13

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	290 gr/m²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome stérile 71	Brome stérile -4	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Laiteron rude 29	Laiteron rude -4	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Séneçon vulgaire 45	Séneçon vulgaire -4	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Mar-d3	
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 47
Brome stérile -1	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Brome stérile 66
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 93
Laiteron rude -1	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Laiteron rude 24
Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0		Séneçon vulgaire 40

Année 3 - Pois d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	130 gr/m²
Ray-grass 15	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome stérile 20	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Gaillet 82	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Laiteron rude 23	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Séneçon vulgaire 33	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2 Fév-d2	
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 15
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Brome stérile 20
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 82
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Laiteron rude 23
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0		Séneçon vulgaire 33

Année 4 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Fév-d2	Pas de labour	340 gr/m²
Ray-grass 21	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome stérile 8	Brome stérile -6	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Gaillet 18	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Laiteron rude 17	Laiteron rude -6	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Séneçon vulgaire 21	Séneçon vulgaire -6	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Aoû-d3 Fév-d2 Aoû-d2 Avr-d3	Ray-grass 14
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Brome stérile 1
Brome stérile -1	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Gaillet 11
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Laiteron rude 10
Laiteron rude -1	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Séneçon vulgaire 14
Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d2 Aoû-d3 Jul-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	260 gr/m²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome stérile 45	Brome stérile -4	Brome stérile -10	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Laiteron rude 28	Laiteron rude -4	Laiteron rude -3	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Séneçon vulgaire 41	Séneçon vulgaire -4	Séneçon vulgaire -4	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2 Avr-d3	Ray-grass 21
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Brome stérile 30
Brome stérile -1	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Gaillet 84
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Laiteron rude 20
Laiteron rude -1	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Séneçon vulgaire 33
Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0		