

Scénario : Scénario 1 avec binage 3 ans
 Exploitation : Digiferme BG
 Parcelle : 31
 Type de sol : limon argileux fin

Commentaires :

Descriptif ITK du dispositif SCV dans Systerre de la campagne 2016 à 2020

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	35 (33)
Brome stérile	24 (22)
Gaillet	29 (46)
Laiteron rude	26 (30)
Séneçon vulgaire	42 (48)

Scénario :

Année 1 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1 Ray-grass 97 Brome stérile 115 Gaillet 42 Laiteron rude 21 Séneçon vulgaire 30	Association de cultures : Aucune Fort Ray-grass -10 Brome stérile -10 Gaillet -10 Laiteron rude -10 Séneçon vulgaire -10	Date des faux semis : Aoû-d2 Jul-d2 Date de semis du couvert : Non défini Date de destruction : Non défini Ray-grass -3 Brome stérile -3 Gaillet 0 Laiteron rude -3 Séneçon vulgaire -2	Pas de labour Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Séneçon vulgaire 0	500 gr/m ² Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Séneçon vulgaire 0
Entre rangs 15 cm Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Séneçon vulgaire 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Séneçon vulgaire 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Séneçon vulgaire 0	Désherbage chimique Aoû-d2 Sep-d3 Nov-d3 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Séneçon vulgaire 0	Score annuel Ray-grass 84 Brome stérile 103 Gaillet 32 Laiteron rude 9 Séneçon vulgaire 18

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d3	300 gr/m ²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Ray-grass 0
Brome stérile 45	Brome stérile -4	Brome stérile 0	Brome stérile -10	Brome stérile 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -8	Gaillet 0
Laiteron rude 28	Laiteron rude -4	Laiteron rude 0	Laiteron rude -2	Laiteron rude 0
Séneçon vulgaire 41	Séneçon vulgaire -4	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -3	Séneçon vulgaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d3 Mar-d3 Mar-d2 Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2	Mar-d3 Nov-d1	Ray-grass 20 Brome stérile 28 Gaillet 79 Laiteron rude 16 Séneçon vulgaire 28
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass -5		
Brome stérile -1	Brome stérile 0	Brome stérile -2		
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet -1		
Laiteron rude -1	Laiteron rude 0	Laiteron rude -6		
Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -6		

Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Jan-d1 Oct-d1 Sep-d1 Aoû-d1 Jul-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	320 gr/m ²
Ray-grass 35	Ray-grass -6	Ray-grass -11	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome stérile 16	Brome stérile -6	Brome stérile -12	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Gaillet 5	Gaillet -6	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0
Laiteron rude 38	Laiteron rude -6	Laiteron rude -5	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Séneçon vulgaire 40	Séneçon vulgaire -6	Séneçon vulgaire -5	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d2 Houe rotative : Herse étrille : Avr-d2 Mar-d3	Fév-d2 Nov-d2	Ray-grass 12 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 20 Séneçon vulgaire 21
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass -5		
Brome stérile -1	Brome stérile 0	Brome stérile -2		
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet -1		
Laiteron rude -1	Laiteron rude 0	Laiteron rude -6		
Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -6		