

Scénario : Nouveau scénario
Exploitation : Digifirme BG
Parcelle : 31
Type de sol : limon argileux fin

Commentaires :

Descriptif ITK du dispositif SCV dans Systemre de la campagne 2016 à 2020

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : | |
|------------------|-----------|--|
| Ray-grass | 33 (33) | |
| Brome stérile | 22 (22) | |
| Gaillet | 46 (46) | |
| Laiteron rude | 30 (30) | |
| Séneçon vulgaire | 48 (48) | |

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------------|--|---|-----------------------------|---------------------|
| Août-d3 | Association de cultures : Autre culture d'hiver Fort | Date des faux semis : Date de semis du couvert : Août-d3 Date de destruction : Non définie | Pas de labour | 600 gr/m² |
| Ray-grass 96 | Ray-grass -10 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Brome stérile 105 | Brome stérile -10 | Brome stérile 0 | Brome stérile 0 | Brome stérile 0 |
| Gaillet 25 | Gaillet -10 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Laiteron rude 19 | Laiteron rude -10 | Laiteron rude 0 | Laiteron rude 0 | Laiteron rude 0 |
| Séneçon vulgaire 25 | Séneçon vulgaire -10 | Séneçon vulgaire 0 | Séneçon vulgaire 0 | Séneçon vulgaire 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 15 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Août-d2 Sep-d3 Nov-d3 | |
| Ray-grass -2 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Ray-grass 84 |
| Brome stérile -2 | Brome stérile 0 | Brome stérile 0 | | Brome stérile 93 |
| Gaillet -2 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Gaillet 13 |
| Laiteron rude -2 | Laiteron rude 0 | Laiteron rude 0 | | Laiteron rude 7 |
| Séneçon vulgaire -2 | Séneçon vulgaire 0 | Séneçon vulgaire 0 | | Séneçon vulgaire 13 |

Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------------|---|--|--------------------|--------------------|
| Oct-d2 | Association de cultures : Aucune Faible | Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Pas de labour | 290 gr/m² |
| Ray-grass 52 | Ray-grass -4 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Brome stérile 71 | Brome stérile -4 | Brome stérile 0 | Brome stérile 0 | Brome stérile 0 |
| Gaillet 97 | Gaillet -4 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Laiteron rude 29 | Laiteron rude -4 | Laiteron rude 0 | Laiteron rude 0 | Laiteron rude 0 |
| Séneçon vulgaire 45 | Séneçon vulgaire -4 | Séneçon vulgaire 0 | Séneçon vulgaire 0 | Séneçon vulgaire 0 |

| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
|---------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|
| 15 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Mar-d3 Nov-d1 | |
| Ray-grass -1 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Ray-grass 47 |
| Brome stérile -1 | Brome stérile 0 | Brome stérile 0 | | Brome stérile 66 |
| Gaillet -1 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Gaillet 93 |
| Laiteron rude -1 | Laiteron rude 0 | Laiteron rude 0 | | Laiteron rude 24 |
| Séneçon vulgaire -1 | Séneçon vulgaire 0 | Séneçon vulgaire 0 | | Séneçon vulgaire 40 |

Année 3 - Pois d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------------|--|--|--------------------|--------------------|
| Nov-d1 | Association de cultures : Aucune Très faible | Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Pas de labour | 130 gr/m² |
| Ray-grass 15 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Brome stérile 20 | Brome stérile 0 | Brome stérile 0 | Brome stérile 0 | Brome stérile 0 |
| Gaillet 82 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Laiteron rude 23 | Laiteron rude 0 | Laiteron rude 0 | Laiteron rude 0 | Laiteron rude 0 |
| Séneçon vulgaire 33 | Séneçon vulgaire 0 | Séneçon vulgaire 0 | Séneçon vulgaire 0 | Séneçon vulgaire 0 |

| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|
| 15 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Fév-d2 Nov-d2 | |
| Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Ray-grass 15 |
| Brome stérile 0 | Brome stérile 0 | Brome stérile 0 | | Brome stérile 20 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Gaillet 82 |
| Laiteron rude 0 | Laiteron rude 0 | Laiteron rude 0 | | Laiteron rude 23 |
| Séneçon vulgaire 0 | Séneçon vulgaire 0 | Séneçon vulgaire 0 | | Séneçon vulgaire 33 |

Année 4 - Orge de printemps

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------------|--|---|----------------------------------|---------------------|
| Fév-d2 | Association de cultures : Aucune Moyen | Date des faux semis : Date de semis du couvert : Août-d2 Date de destruction : Fév-d2 | Pas de labour | 340 gr/m² |
| Ray-grass 21 | Ray-grass -6 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Brome stérile 8 | Brome stérile -6 | Brome stérile 0 | Brome stérile 0 | Brome stérile 0 |
| Gaillet 18 | Gaillet -6 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Laiteron rude 17 | Laiteron rude -6 | Laiteron rude 0 | Laiteron rude 0 | Laiteron rude 0 |
| Séneçon vulgaire 21 | Séneçon vulgaire -6 | Séneçon vulgaire 0 | Séneçon vulgaire 0 | Séneçon vulgaire 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 15 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Fév-d2 Avr-d3 Août-d2 Août-d3 | Ray-grass 14 |
| Ray-grass -1 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Brome stérile 1 |
| Brome stérile -1 | Brome stérile 0 | Brome stérile 0 | | Gaillet 11 |
| Gaillet -1 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Laiteron rude 10 |
| Laiteron rude -1 | Laiteron rude 0 | Laiteron rude 0 | | Séneçon vulgaire 14 |
| Séneçon vulgaire -1 | Séneçon vulgaire 0 | Séneçon vulgaire 0 | | |

Année 5 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------------|---|--|---------------------|---------------------|
| Oct-d3 | Association de cultures : Aucune Faible | Date des faux semis : Jul-d3 Août-d3 Oct-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Pas de labour | 260 gr/m² |
| Ray-grass 35 | Ray-grass -4 | Ray-grass -9 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Brome stérile 45 | Brome stérile -4 | Brome stérile -10 | Brome stérile 0 | Brome stérile 0 |
| Gaillet 93 | Gaillet -4 | Gaillet -5 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Laiteron rude 28 | Laiteron rude -4 | Laiteron rude -3 | Laiteron rude 0 | Laiteron rude 0 |
| Séneçon vulgaire 41 | Séneçon vulgaire -4 | Séneçon vulgaire -4 | Séneçon vulgaire 0 | Séneçon vulgaire 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 15 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Avr-d3 Nov-d2 | Ray-grass 21 |
| Ray-grass -1 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Brome stérile 30 |
| Brome stérile -1 | Brome stérile 0 | Brome stérile 0 | | Gaillet 84 |
| Gaillet -1 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Laiteron rude 20 |
| Laiteron rude -1 | Laiteron rude 0 | Laiteron rude 0 | | Séneçon vulgaire 33 |
| Séneçon vulgaire -1 | Séneçon vulgaire 0 | Séneçon vulgaire 0 | | |