

Scénario : scénario 3
 Exploitation : Digiferme BG
 Parcelle : 31
 Type de sol : limon argileux fin

Commentaires :

Descriptif ITK du dispositif SCV dans Systerre de la campagne 2016 à 2020

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	2 (33)
Brome stérile	0 (22)
Gaillet	12 (46)
Laiteron rude	55 (30)
Séneçon vulgaire	53 (48)

Scénario :

Année 1 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Orge de printemps Fort	Date des faux semis : Jul-d2 Oct-d1 Sep-d1 Aoû-d1 Jan-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	190 gr/m ²
Ray-grass 35 Brome stérile 16 Gaillet 5 Laiteron rude 38 Séneçon vulgaire 40	Ray-grass -10 Brome stérile -10 Gaillet -10 Laiteron rude -10 Séneçon vulgaire -10	Ray-grass -11 Brome stérile -12 Gaillet -6 Laiteron rude -5 Séneçon vulgaire -5	Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Séneçon vulgaire 0	Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Séneçon vulgaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Séneçon vulgaire 0		Ray-grass 14 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 23 Séneçon vulgaire 25

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d3 Aoû-d3 Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non défini Date de destruction : Non défini	Pas de labour	350 gr/m ²	
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -11	Ray-grass 0	Ray-grass 0	
Brome stérile 21	Brome stérile -4	Brome stérile -11	Brome stérile 0	Brome stérile 0	
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0	
Laiteron rude 26	Laiteron rude -4	Laiteron rude -3	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	
Séneçon vulgaire 36	Séneçon vulgaire -4	Séneçon vulgaire -3	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d3 Mar-d3 Mar-d2 Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2			
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass -5		Ray-grass 0	
Brome stérile -1	Brome stérile 0	Brome stérile -2		Brome stérile 3	
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet -1		Gaillet 76	
Laiteron rude -1	Laiteron rude 0	Laiteron rude -6		Laiteron rude 12	
Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -6		Séneçon vulgaire 23	

Année 3 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Oct-d1 Jul-d2 Sep-d1 Aoû-d1 Mar-d1 Fév-d1 Jan-d1 Date de semis du couvert : Non défini Date de destruction : Non défini	Pas de labour	275 gr/m ²
Ray-grass 12	Ray-grass -10	Ray-grass -12	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome stérile 8	Brome stérile -10	Brome stérile -13	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Gaillet 1	Gaillet -10	Gaillet -8	Gaillet 0	Gaillet 0
Laiteron rude 61	Laiteron rude -10	Laiteron rude -6	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Séneçon vulgaire 52	Séneçon vulgaire -10	Séneçon vulgaire -7	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Brome stérile 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Laiteron rude 44
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0		Séneçon vulgaire 36

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Date de semis Nov-d1 Ray-grass 18 Brome stérile 21 Gaillet 84 Laiteron rude 26 Séneçon vulgaire 36	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4 Brome stérile -4 Gaillet -4 Laiteron rude -4 Séneçon vulgaire -4	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Séneçon vulgaire 0	Date de labour Nov-d1 Ray-grass -9 Brome stérile -16 Gaillet -16 Laiteron rude -3 Séneçon vulgaire -5	Densité de semis 340 gr/m ² Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Séneçon vulgaire 0
Entre rangs 15 cm Ray-grass -1 Brome stérile -1 Gaillet -1 Laiteron rude -1 Séneçon vulgaire -1	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Séneçon vulgaire 0	Désherbage mécanique Bineuse : Mar-d2 Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2 Ray-grass -2 Brome stérile -1 Gaillet -0 Laiteron rude -1 Séneçon vulgaire -1	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 3 Brome stérile 0 Gaillet 63 Laiteron rude 16 Séneçon vulgaire 25

Année 5 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Date de semis Mar-d2 Ray-grass 35 Brome stérile 16 Gaillet 5 Laiteron rude 38 Séneçon vulgaire 40	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Ray-grass -6 Brome stérile -6 Gaillet -6 Laiteron rude -6 Séneçon vulgaire -6	Interculture Date des faux semis : Oct-d1 Jul-d2 Aoû-d1 Sep-d1 Jan-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass -11 Brome stérile -12 Gaillet -6 Laiteron rude -5 Séneçon vulgaire -5	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Séneçon vulgaire 0	Densité de semis 310 gr/m ² Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Séneçon vulgaire 0
Entre rangs 15 cm Ray-grass -1 Brome stérile -1 Gaillet -1 Laiteron rude -1 Séneçon vulgaire -1	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Séneçon vulgaire 0	Désherbage mécanique Bineuse : Avr-d1 Houe rotative : Herse étrille : Mar-d3 Avr-d1 Ray-grass -6 Brome stérile -2 Gaillet -1 Laiteron rude -6 Séneçon vulgaire -6	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 11 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 21 Séneçon vulgaire 22

Année 6 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Fév-d1 Aoû-d1 Jan-d1 Jul-d3 Oct-d1 Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	11 gr/m ²
Ray-grass 12 Brome stérile 8 Gaillet 1 Laiteron rude 67 Séneçon vulgaire 55	Ray-grass -4 Brome stérile -4 Gaillet -4 Laiteron rude -4 Séneçon vulgaire -4	Ray-grass -12 Brome stérile -13 Gaillet -7 Laiteron rude -5 Séneçon vulgaire -6	Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Séneçon vulgaire 0	Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Séneçon vulgaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2 Jun-d2 Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 50 Séneçon vulgaire 40
Ray-grass -2 Brome stérile -2 Gaillet -2 Laiteron rude -2 Séneçon vulgaire -2	Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Séneçon vulgaire 0	Ray-grass -0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude -6 Séneçon vulgaire -4		

Année 7 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Nov-d3	11 gr/m ²
Ray-grass 12 Brome stérile 8 Gaillet 1 Laiteron rude 67 Séneçon vulgaire 55	Ray-grass -4 Brome stérile -4 Gaillet -4 Laiteron rude -4 Séneçon vulgaire -4	Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Séneçon vulgaire 0	Ray-grass -6 Brome stérile -11 Gaillet -15 Laiteron rude -3 Séneçon vulgaire -5	Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Séneçon vulgaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d2 Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 52 Séneçon vulgaire 40
Ray-grass -2 Brome stérile -2 Gaillet -2 Laiteron rude -2 Séneçon vulgaire -2	Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Séneçon vulgaire 0	Ray-grass -0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude -6 Séneçon vulgaire -4		

Année 8 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1 Ray-grass 18 Brome stérile 21 Gaillet 84 Laiteron rude 26 Séneçon vulgaire 36	Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4 Brome stérile -4 Gaillet -4 Laiteron rude -4 Séneçon vulgaire -4	Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Séneçon vulgaire 0	Nov-d1 Ray-grass -9 Brome stérile -16 Gaillet -16 Laiteron rude -3 Séneçon vulgaire -5	350 gr/m ² Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Séneçon vulgaire 0
Entre rangs 15 cm Ray-grass -1 Brome stérile -1 Gaillet -1 Laiteron rude -1 Séneçon vulgaire -1	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0 Laiteron rude 0 Séneçon vulgaire 0	Désherbage mécanique Bineuse : Mar-d2 Avr-d3 Mar-d3 Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2 Ray-grass -5 Brome stérile -2 Gaillet -1 Laiteron rude -6 Séneçon vulgaire -6	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 62 Laiteron rude 12 Séneçon vulgaire 21