



Odera 2

Exploitation : 1_HdF_DUBOIS
Parcelle : HARICOT
Type de sol : Limon-battant

Commentaires :

Parcelle suivie par l'UNILET pour les expés

Historique très complet remontant à 2003 à trouver au lien tux :
file:///192.168.100.10/commun/Projets/Adventurh/5_PROJETS_ASSOCIES/3_GAROTOX/Action_1_Connaissances_Adventices/Action_1A_Entretiens_Agriculteurs/2_Donnees_enq

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	76	
Ray-grass	18	
Datura stramoine	58	
Morelle	69	

Situation initiale :

Année 1 - Betteraves

Date de semis Mar-d2 Chénopode 64 Ray-grass 35 Datura stramoine 0 Morelle 0	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0 Morelle 0	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Nov-d2 Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0 Morelle 0	Date de labour Nov-d2 Chénopode -2 Ray-grass -7 Datura stramoine -4 Morelle -3	Densité de semis 10 gr/m² Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0 Morelle 0
Entre rangs 45 cm Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0 Morelle 0	Variété Non couvrante Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0 Morelle 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0 Morelle 0	Désherbage chimique Mar-d3 Avr-d1 Avr-d2 Avr-d3	Score annuel Chénopode 62 Ray-grass 28 Datura stramoine 0 Morelle 0

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d2 Chénopode 11 Ray-grass 52 Datura stramoine 0 Morelle 0	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Chénopode -4 Ray-grass -4 Datura stramoine -4 Morelle -4	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d3 Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode -2 Ray-grass -4 Datura stramoine -2 Morelle -2	Date de labour Pas de labour Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0 Morelle 0	Densité de semis 250 gr/m² Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0 Morelle 0
Entre rangs 15 cm Chénopode -1 Ray-grass -1 Datura stramoine -1 Morelle -1	Variété Non couvrante Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0 Morelle 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0 Morelle 0	Désherbage chimique Mar-d2	Score annuel Chénopode 4 Ray-grass 43 Datura stramoine 0 Morelle 0

Année 3 - Pomme de terre

Date de semis <div>Avr-d2</div> <div>Chénopode 63</div> <div>Ray-grass 19</div> <div>Datura stramoine 19</div> <div>Morelle 19</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Aoû-d2</div> Date de destruction : <div>Nov-d2</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div>	Date de labour <div>Nov-d2</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Ray-grass -7</div> <div>Datura stramoine -4</div> <div>Morelle -3</div>	Densité de semis 3.7 gr/m² <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div>
Entre rangs 90 cm <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div>	Variété Non couvrante <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div>	Désherbage chimique <div>Mai-d2</div> <div>Avr-d3</div>	Score annuel <div>Chénopode 60</div> <div>Ray-grass 12</div> <div>Datura stramoine 16</div> <div>Morelle 16</div>

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d2</div> <div>Chénopode 11</div> <div>Ray-grass 52</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible <div>Chénopode -4</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Datura stramoine -4</div> <div>Morelle -4</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Aoû-d3</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Datura stramoine -2</div> <div>Morelle -2</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div>	Densité de semis 250 gr/m² <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div>
Entre rangs 15 cm <div>Chénopode -1</div> <div>Ray-grass -1</div> <div>Datura stramoine -1</div> <div>Morelle -1</div>	Variété Non couvrante <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div>	Désherbage chimique <div>Mar-d2</div>	Score annuel <div>Chénopode 4</div> <div>Ray-grass 43</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div>

Année 5 - Haricot

Date de semis <div>Jun-d1</div> <div>Chénopode 38</div> <div>Ray-grass 1</div> <div>Datura stramoine 113</div> <div>Morelle 113</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Mai-d1</div> Date de semis du couvert : <div>Aoû-d2</div> Date de destruction : <div>Nov-d2</div> <div>Chénopode -3</div> <div>Ray-grass -1</div> <div>Datura stramoine -0</div> <div>Morelle -0</div>	Date de labour <div>Nov-d2</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Ray-grass -7</div> <div>Datura stramoine -4</div> <div>Morelle -3</div>	Densité de semis 30 gr/m² <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div>
Entre rangs 45 cm <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div>	Variété Non couvrante <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div>	Désherbage chimique <div>Jun-d1</div> <div>Jun-d2</div> <div>Jun-d3</div> <div>Jul-d1</div> <div>Jul-d2</div>	Score annuel <div>Chénopode 33</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Datura stramoine 109</div> <div>Morelle 110</div>

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d2</div> <div>Chénopode 11</div> <div>Ray-grass 52</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible <div>Chénopode -4</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Datura stramoine -4</div> <div>Morelle -4</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Aoû-d3</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Datura stramoine -2</div> <div>Morelle -2</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div>	Densité de semis 250 gr/m² <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div>
Entre rangs 15 cm <div>Chénopode -1</div> <div>Ray-grass -1</div> <div>Datura stramoine -1</div> <div>Morelle -1</div>	Variété Non couvrante <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div>	Désherbage chimique <div>Mar-d2</div>	Score annuel <div>Chénopode 4</div> <div>Ray-grass 43</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div>

Année 7 - Pomme de terre

Date de semis <div>Avr-d2</div> <div>Chénopode 63</div> <div>Ray-grass 19</div> <div>Datura stramoine 19</div> <div>Morelle 19</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Aoû-d2</div> Date de destruction : <div>Nov-d2</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div>	Date de labour <div>Nov-d2</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Ray-grass -7</div> <div>Datura stramoine -4</div> <div>Morelle -3</div>	Densité de semis 3.7 gr/m² <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div>
Entre rangs 90 cm <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div>	Variété Non couvrante <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div>	Désherbage chimique <div>Avr-d3</div> <div>Mai-d2</div>	Score annuel <div>Chénopode 60</div> <div>Ray-grass 12</div> <div>Datura stramoine 16</div> <div>Morelle 16</div>

Année 8 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d2</div> <div>Chénopode 11</div> <div>Ray-grass 52</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible <div>Chénopode -4</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Datura stramoine -4</div> <div>Morelle -4</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Aoû-d3</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Datura stramoine -2</div> <div>Morelle -2</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div>	Densité de semis 250 gr/m² <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div>
Entre rangs 15 cm <div>Chénopode -1</div> <div>Ray-grass -1</div> <div>Datura stramoine -1</div> <div>Morelle -1</div>	Variété Non couvrante <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div>	Désherbage chimique <div>Mar-d2</div>	Score annuel <div>Chénopode 4</div> <div>Ray-grass 43</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div>

Année 9 - Betteraves

Date de semis Mar-d2 Chénopode 64 Ray-grass 35 Datura stramoine 0 Morelle 0	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0 Morelle 0	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Nov-d2 Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0 Morelle 0	Date de labour Nov-d2 Chénopode -2 Ray-grass -7 Datura stramoine -4 Morelle -3	Densité de semis 10 gr/m² Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0 Morelle 0
Entre rangs 45 cm Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0 Morelle 0	Variété Non couvrante Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0 Morelle 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0 Morelle 0	Désherbage chimique Mar-d3 Avr-d1 Avr-d3 Avr-d2	Score annuel Chénopode 62 Ray-grass 28 Datura stramoine 0 Morelle 0

Année 10 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d2 Chénopode 11 Ray-grass 52 Datura stramoine 0 Morelle 0	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Chénopode -4 Ray-grass -4 Datura stramoine -4 Morelle -4	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d3 Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode -2 Ray-grass -4 Datura stramoine -2 Morelle -2	Date de labour Pas de labour Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0 Morelle 0	Densité de semis 250 gr/m² Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0 Morelle 0
Entre rangs 15 cm Chénopode -1 Ray-grass -1 Datura stramoine -1 Morelle -1	Variété Non couvrante Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0 Morelle 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0 Morelle 0	Désherbage chimique Mar-d2	Score annuel Chénopode 4 Ray-grass 43 Datura stramoine 0 Morelle 0

Année 11 - Pomme de terre

Date de semis Avr-d2 Chénopode 63 Ray-grass 19 Datura stramoine 19 Morelle 19	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0 Morelle 0	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Nov-d2 Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0 Morelle 0	Date de labour Nov-d2 Chénopode -2 Ray-grass -7 Datura stramoine -4 Morelle -3	Densité de semis 3.7 gr/m² Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0 Morelle 0
Entre rangs 90 cm Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0 Morelle 0	Variété Non couvrante Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0 Morelle 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0 Morelle 0	Désherbage chimique Avr-d3 Mai-d2	Score annuel Chénopode 60 Ray-grass 12 Datura stramoine 16 Morelle 16

Année 12 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d2 Chénopode 11 Ray-grass 52 Datura stramoine 0 Morelle 0	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Chénopode -4 Ray-grass -4 Datura stramoine -4 Morelle -4	Interculture Date des faux semis : Aoû-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode -2 Ray-grass -4 Datura stramoine -2 Morelle -2	Date de labour Pas de labour Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0 Morelle 0	Densité de semis 250 gr/m² Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0 Morelle 0
Entre rangs 15 cm Chénopode -1 Ray-grass -1 Datura stramoine -1 Morelle -1	Variété Non couvrante Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0 Morelle 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0 Morelle 0	Désherbage chimique Mar-d2	Score annuel Chénopode 4 Ray-grass 43 Datura stramoine 0 Morelle 0

Année 13 - Haricot

Date de semis Jun-d1 Chénopode 38 Ray-grass 1 Datura stramoine 113 Morelle 113	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0 Morelle 0	Interculture Date des faux semis : Mai-d1 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Nov-d2 Chénopode -3 Ray-grass -1 Datura stramoine -0 Morelle -0	Date de labour Nov-d2 Chénopode -2 Ray-grass -7 Datura stramoine -4 Morelle -3	Densité de semis 30 gr/m² Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0 Morelle 0
Entre rangs 45 cm Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0 Morelle 0	Variété Non couvrante Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0 Morelle 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0 Morelle 0	Désherbage chimique Jun-d3 Jun-d2 Jun-d1 Jul-d1 Jul-d2	Score annuel Chénopode 33 Ray-grass 0 Datura stramoine 109 Morelle 110

Année 14 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d2 Chénopode 11 Ray-grass 52 Datura stramoine 0 Morelle 0	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Chénopode -4 Ray-grass -4 Datura stramoine -4 Morelle -4	Interculture Date des faux semis : Aoû-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode -2 Ray-grass -4 Datura stramoine -2 Morelle -2	Date de labour Pas de labour Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0 Morelle 0	Densité de semis 250 gr/m² Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0 Morelle 0
Entre rangs 15 cm Chénopode -1 Ray-grass -1 Datura stramoine -1 Morelle -1	Variété Non couvrante Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0 Morelle 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0 Morelle 0	Désherbage chimique Mar-d2	Score annuel Chénopode 4 Ray-grass 43 Datura stramoine 0 Morelle 0

Année 15 - Pomme de terre

Date de semis <div>Avr-d2</div> <div>Chénopode 63</div> <div>Ray-grass 19</div> <div>Datura stramoine 19</div> <div>Morelle 19</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Aoû-d2</div> Date de destruction : <div>Nov-d2</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div>	Date de labour <div>Nov-d2</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Ray-grass -7</div> <div>Datura stramoine -4</div> <div>Morelle -3</div>	Densité de semis 3.7 gr/m² <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div>
Entre rangs 90 cm <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div>	Variété Non couvrante <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div>	Désherbage chimique <div>Avr-d3</div> <div>Mai-d2</div>	Score annuel <div>Chénopode 60</div> <div>Ray-grass 12</div> <div>Datura stramoine 16</div> <div>Morelle 16</div>

Année 16 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d2</div> <div>Chénopode 11</div> <div>Ray-grass 52</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible <div>Chénopode -4</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Datura stramoine -4</div> <div>Morelle -4</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Oct-d1</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Datura stramoine -0</div> <div>Morelle -0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div>	Densité de semis 250 gr/m² <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div>
Entre rangs 15 cm <div>Chénopode -1</div> <div>Ray-grass -1</div> <div>Datura stramoine -1</div> <div>Morelle -1</div>	Variété Non couvrante <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div>	Désherbage chimique <div>Oct-d3</div>	Score annuel <div>Chénopode 5</div> <div>Ray-grass 43</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div>

Année 17 - Betteraves

Date de semis <div>Mar-d2</div> <div>Chénopode 64</div> <div>Ray-grass 35</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Aoû-d1</div> Date de destruction : <div>Nov-d2</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div>	Date de labour <div>Nov-d2</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Ray-grass -7</div> <div>Datura stramoine -4</div> <div>Morelle -3</div>	Densité de semis 10 gr/m² <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div>
Entre rangs 45 cm <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div>	Variété Non couvrante <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div>	Désherbage chimique <div>Avr-d3</div> <div>Mar-d3</div> <div>Avr-d1</div> <div>Avr-d2</div>	Score annuel <div>Chénopode 62</div> <div>Ray-grass 28</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div>

Date de semis

Jun-d1

Chénopode38

Ray-grass1

Datura stramoine113

Morelle113

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Très faible

Chénopode0

Ray-grass0

Datura stramoine0

Morelle0

Interculture

Date des faux semis :
Avr-d1Mai-d1

Date de semis du couvert :
Non définie

Date de destruction :
Non définie

Chénopode-6

Ray-grass-3

Datura stramoine-0

Morelle-0

Date de labour

Jan-d2

Chénopode-2

Ray-grass-6

Datura stramoine-4

Morelle-3

Densité de semis

30 gr/m²

Chénopode0

Ray-grass0

Datura stramoine0

Morelle0

Entre rangs

45 cm

Chénopode0

Ray-grass0

Datura stramoine0

Morelle0

Variété

Non couvrante

Chénopode0

Ray-grass0

Datura stramoine0

Morelle0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Jul-d1

Houe rotative :

Herse étrille :

Chénopode-2

Ray-grass0

Datura stramoine-6

Morelle-6

Désherbage chimique

Jul-d1Jun-d3Jun-d2Jun-d1

Jul-d2

Score annuel

Chénopode28

Ray-grass0

Datura stramoine104

Morelle104