



Odera 2

Scénario : Nouveau scénario
Exploitation : 1_DUBOIS_s_cenarios
Parcelle : HARICOT
Type de sol : Limon-battant

Commentaires :

Parcelle suivie par l'UNILET pour les expés

Historique très complet remontant à 2003 à trouver au lien tux :
file:///192.168.100.10(commun)\Projets\Adventurh\5_PROJETS_ASSOCIES\3_GAROTOX>Action_1_Connaissances_Adventices\Action_1A_Entretiens_Agriculteurs\2_Donnees_eng

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	71 (76)	
Ray-grass	17 (18)	
Datura stramoine	55 (58)	

Scénario :

Année 1 - Haricot

Date de semis Jun-d1 Chénopode 38 Ray-grass 1 Datura stramoine 113	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0	Interculture Date des faux semis : Jun-d1 Mai-d2 Avr-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode -8 Ray-grass -2 Datura stramoine -7	Date de labour Jan-d2 Chénopode -2 Ray-grass -6 Datura stramoine -4	Densité de semis 30 gr/m² Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0
Entre rangs 45 cm Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0	Variété Non couvrante Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0	Désherbage mécanique Bineuse : Jul-d1 Houe rotative : Herse étrille : Chénopode -2 Ray-grass 0 Datura stramoine -6	Désherbage chimique Jun-d2 Jul-d2 Jul-d1 Jun-d3 Jun-d1	Score annuel Chénopode 26 Ray-grass 0 Datura stramoine 97

Année 2 - Betteraves

Date de semis Mar-d2 Chénopode 64 Ray-grass 35 Datura stramoine 0	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Nov-d2 Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0	Date de labour Nov-d2 Chénopode -2 Ray-grass -7 Datura stramoine -4	Densité de semis 10 gr/m² Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0
Entre rangs 45 cm Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0	Variété Non couvrante Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d1 Chénopode -3 Ray-grass -2 Datura stramoine 0	Désherbage chimique Avr-d3 Avr-d2 Mar-d3	Score annuel Chénopode 59 Ray-grass 26 Datura stramoine 0

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d2 Chénopode 11 Ray-grass 52 Datura stramoine 0	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Chénopode -4 Ray-grass -4 Datura stramoine -4	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Oct-d1 Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode -1 Ray-grass -4 Datura stramoine -0	Date de labour Pas de labour Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0	Densité de semis 250 gr/m² Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0
Entre rangs 15 cm Chénopode -1 Ray-grass -1 Datura stramoine -1	Variété Non couvrante Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0	Désherbage mécanique Bineuse : Mar-d1 Houe rotative : Herse étrille : Chénopode -2 Ray-grass -1 Datura stramoine 0	Désherbage chimique Oct-d3	Score annuel Chénopode 3 Ray-grass 41 Datura stramoine 0

Année 4 - Pomme de terre

Date de semis <div>Avr-d2</div> <div>Chénopode 63</div> <div>Ray-grass 19</div> <div>Datura stramoine 19</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Avr-d1</div> Date de semis du couvert : <div>Aoû-d2</div> Date de destruction : <div>Nov-d2</div> <div>Chénopode -3</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Datura stramoine 0</div>	Date de labour <div>Nov-d2</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Ray-grass -7</div> <div>Datura stramoine -4</div>	Densité de semis 3.7 gr/m² <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>
Entre rangs 90 cm <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>	Variété Non couvrante <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>	Désherbage chimique <div>Avr-d3</div> <div>Mai-d2</div>	Score annuel <div>Chénopode 57</div> <div>Ray-grass 10</div> <div>Datura stramoine 16</div>

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d2</div> <div>Chénopode 11</div> <div>Ray-grass 52</div> <div>Datura stramoine 0</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible <div>Chénopode -4</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Datura stramoine -4</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Aoû-d3</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Datura stramoine -2</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>	Densité de semis 250 gr/m² <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>
Entre rangs 15 cm <div>Chénopode -1</div> <div>Ray-grass -1</div> <div>Datura stramoine -1</div>	Variété Non couvrante <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : <div>Mar-d1</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Chénopode -2</div> <div>Ray-grass -1</div> <div>Datura stramoine 0</div>	Désherbage chimique <div>Mar-d2</div>	Score annuel <div>Chénopode 2</div> <div>Ray-grass 42</div> <div>Datura stramoine 0</div>

Année 6 - Haricot

Date de semis <div>Jun-d1</div> <div>Chénopode 38</div> <div>Ray-grass 1</div> <div>Datura stramoine 113</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Jun-d1</div> <div>Mai-d2</div> <div>Avr-d1</div> Date de semis du couvert : <div>Aoû-d2</div> Date de destruction : <div>Nov-d2</div> <div>Chénopode -8</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Datura stramoine -7</div>	Date de labour <div>Nov-d2</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Ray-grass -7</div> <div>Datura stramoine -4</div>	Densité de semis 30 gr/m² <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>
Entre rangs 45 cm <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>	Variété Non couvrante <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>	Désherbage chimique <div>Jun-d2</div> <div>Jul-d1</div> <div>Jun-d1</div> <div>Jul-d2</div> <div>Jun-d3</div>	Score annuel <div>Chénopode 28</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Datura stramoine 103</div>

Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d2</div> <div>Chénopode 11</div> <div>Ray-grass 52</div> <div>Datura stramoine 0</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible <div>Chénopode -4</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Datura stramoine -4</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Aoû-d3</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Datura stramoine -2</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>	Densité de semis 250 gr/m² <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>
Entre rangs 15 cm <div>Chénopode -1</div> <div>Ray-grass -1</div> <div>Datura stramoine -1</div>	Variété Non couvrante <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : <div>Mar-d1</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Chénopode -2</div> <div>Ray-grass -1</div> <div>Datura stramoine 0</div>	Désherbage chimique <div>Mar-d2</div>	Score annuel <div>Chénopode 2</div> <div>Ray-grass 42</div> <div>Datura stramoine 0</div>

Année 8 - Pomme de terre

Date de semis Avr-d2 Chénopode 63 Ray-grass 19 Datura stramoine 19	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0	Interculture Date des faux semis : Avr-d1 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Nov-d2 Chénopode -3 Ray-grass -2 Datura stramoine 0	Date de labour Nov-d2 Chénopode -2 Ray-grass -7 Datura stramoine -4	Densité de semis 3.7 gr/m² Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0
Entre rangs 90 cm Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0	Variété Non couvrante Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0	Désherbage chimique Mai-d2 Avr-d3	Score annuel Chénopode 57 Ray-grass 10 Datura stramoine 16

Année 9 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d2 Chénopode 11 Ray-grass 52 Datura stramoine 0	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Chénopode -4 Ray-grass -4 Datura stramoine -4	Interculture Date des faux semis : Aoû-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode -2 Ray-grass -4 Datura stramoine -2	Date de labour Pas de labour Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0	Densité de semis 250 gr/m² Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0
Entre rangs 15 cm Chénopode -1 Ray-grass -1 Datura stramoine -1	Variété Non couvrante Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0	Désherbage mécanique Bineuse : Mar-d1 Houe rotative : Herse étrille : Chénopode -2 Ray-grass -1 Datura stramoine 0	Désherbage chimique Mar-d2	Score annuel Chénopode 2 Ray-grass 42 Datura stramoine 0

Année 10 - Betteraves

Date de semis Mar-d2 Chénopode 64 Ray-grass 35 Datura stramoine 0	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Nov-d2 Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0	Date de labour Nov-d2 Chénopode -2 Ray-grass -7 Datura stramoine -4	Densité de semis 10 gr/m² Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0
Entre rangs 45 cm Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0	Variété Non couvrante Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d1 Chénopode -3 Ray-grass -2 Datura stramoine 0	Désherbage chimique Avr-d2 Avr-d1 Mar-d3 Avr-d3	Score annuel Chénopode 59 Ray-grass 26 Datura stramoine 0

Année 11 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d2 Chénopode 11 Ray-grass 52 Datura stramoine 0	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Chénopode -4 Ray-grass -4 Datura stramoine -4	Interculture Date des faux semis : Aoû-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode -2 Ray-grass -4 Datura stramoine -2	Date de labour Pas de labour Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0	Densité de semis 250 gr/m² Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0
Entre rangs 15 cm Chénopode -1 Ray-grass -1 Datura stramoine -1	Variété Non couvrante Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0	Désherbage mécanique Bineuse : Mar-d1 Houe rotative : Herse étrille : Chénopode -2 Ray-grass -1 Datura stramoine 0	Désherbage chimique Mar-d2	Score annuel Chénopode 2 Ray-grass 42 Datura stramoine 0

Année 12 - Pomme de terre

Date de semis (Avr-d2) Chénopode 63 Ray-grass 19 Datura stramoine 19	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0	Interculture Date des faux semis : (Avr-d1) Date de semis du couvert : (Aoû-d2) Date de destruction : (Nov-d2) Chénopode -3 Ray-grass -2 Datura stramoine 0	Date de labour (Nov-d2) Chénopode -2 Ray-grass -7 Datura stramoine -4	Densité de semis 3.7 gr/m² Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0
Entre rangs 90 cm Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0	Variété Non couvrante Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0	Désherbage chimique (Avr-d3) (Mai-d2)	Score annuel Chénopode 57 Ray-grass 10 Datura stramoine 16

Année 13 - Blé d'hiver

Date de semis (Oct-d2) Chénopode 11 Ray-grass 52 Datura stramoine 0	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Chénopode -4 Ray-grass -4 Datura stramoine -4	Interculture Date des faux semis : (Aoû-d3) Date de semis du couvert : (Non définie) Date de destruction : (Non définie) Chénopode -2 Ray-grass -4 Datura stramoine -2	Date de labour (Pas de labour) Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0	Densité de semis 250 gr/m² Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0
Entre rangs 15 cm Chénopode -1 Ray-grass -1 Datura stramoine -1	Variété Non couvrante Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0	Désherbage mécanique Bineuse : (Mar-d1) Houe rotative : Herse étrille : Chénopode -2 Ray-grass -1 Datura stramoine 0	Désherbage chimique (Mar-d2)	Score annuel Chénopode 2 Ray-grass 42 Datura stramoine 0

Année 14 - Haricot

Date de semis (Jun-d1) Chénopode 38 Ray-grass 1 Datura stramoine 113	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0	Interculture Date des faux semis : (Jun-d1) (Mai-d2) (Avr-d1) Date de semis du couvert : (Aoû-d2) Date de destruction : (Nov-d2) Chénopode -8 Ray-grass -2 Datura stramoine -7	Date de labour (Nov-d2) Chénopode -2 Ray-grass -7 Datura stramoine -4	Densité de semis 30 gr/m² Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0
Entre rangs 45 cm Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0	Variété Non couvrante Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0	Désherbage chimique (Jul-d1) (Jun-d3) (Jun-d2) (Jun-d1) (Jul-d2)	Score annuel Chénopode 28 Ray-grass 0 Datura stramoine 103

Année 15 - Blé d'hiver

Date de semis (Oct-d2) Chénopode 11 Ray-grass 52 Datura stramoine 0	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Chénopode -4 Ray-grass -4 Datura stramoine -4	Interculture Date des faux semis : (Aoû-d3) Date de semis du couvert : (Non définie) Date de destruction : (Non définie) Chénopode -2 Ray-grass -4 Datura stramoine -2	Date de labour (Pas de labour) Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0	Densité de semis 250 gr/m² Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0
Entre rangs 15 cm Chénopode -1 Ray-grass -1 Datura stramoine -1	Variété Non couvrante Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0	Désherbage mécanique Bineuse : (Mar-d1) Houe rotative : Herse étrille : Chénopode -2 Ray-grass -1 Datura stramoine 0	Désherbage chimique (Mar-d2)	Score annuel Chénopode 2 Ray-grass 42 Datura stramoine 0

Année 16 - Pomme de terre

Date de semis Avr-d2 Chénopode 63 Ray-grass 19 Datura stramoine 19	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0	Interculture Date des faux semis : Avr-d1 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Nov-d2 Chénopode -3 Ray-grass -2 Datura stramoine 0	Date de labour Nov-d2 Chénopode -2 Ray-grass -7 Datura stramoine -4	Densité de semis 3.7 gr/m² Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0
Entre rangs 90 cm Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0	Variété Non couvrante Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0	Désherbage chimique Avr-d3 Mai-d2	Score annuel Chénopode 57 Ray-grass 10 Datura stramoine 16

Année 17 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d2 Chénopode 11 Ray-grass 52 Datura stramoine 0	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Chénopode -4 Ray-grass -4 Datura stramoine -4	Interculture Date des faux semis : Aoû-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode -2 Ray-grass -4 Datura stramoine -2	Date de labour Pas de labour Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0	Densité de semis 250 gr/m² Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0
Entre rangs 15 cm Chénopode -1 Ray-grass -1 Datura stramoine -1	Variété Non couvrante Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0	Désherbage mécanique Bineuse : Mar-d1 Houe rotative : Herse étrille : Chénopode -2 Ray-grass -1 Datura stramoine 0	Désherbage chimique Mar-d2	Score annuel Chénopode 2 Ray-grass 42 Datura stramoine 0

Année 18 - Betteraves

Date de semis Mar-d2 Chénopode 64 Ray-grass 35 Datura stramoine 0	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Nov-d2 Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0	Date de labour Nov-d2 Chénopode -2 Ray-grass -7 Datura stramoine -4	Densité de semis 10 gr/m² Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0
Entre rangs 45 cm Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0	Variété Non couvrante Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d1 Chénopode -3 Ray-grass -2 Datura stramoine 0	Désherbage chimique Avr-d3 Avr-d2 Avr-d1 Mar-d3	Score annuel Chénopode 59 Ray-grass 26 Datura stramoine 0