

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

Gouz
MJB
Limon Argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	48	
Paturin	55	
Matricaire	67	
Ray-grass	44	

Situation initiale :

Année 1 - Betteraves

Date de semis <p>Mar-d3</p> <p>Chénopode 66</p> <p>Paturin 38</p> <p>Matricaire 47</p> <p>Ray-grass 33</p>	Étouffement culture <p>Association de cultures : Aucune Très faible</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	Interculture <p>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Déc-d2</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	Date de labour <p>Pas de labour</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	Densité de semis <p>10 gr/m²</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Ray-grass 0</p>
Entre rangs <p>45 cm</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	Variété <p>Moyennement couvrante</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Paturin -1</p> <p>Matricaire -1</p> <p>Ray-grass -1</p>	Désherbage mécanique <p>Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Paturin -2</p> <p>Matricaire -1</p> <p>Ray-grass 0</p>	Désherbage chimique <p>Jun-d1 Mai-d2 Avr-d3 Avr-d2</p>	Score annuel <p>Chénopode 63</p> <p>Paturin 35</p> <p>Matricaire 45</p> <p>Ray-grass 32</p>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	300 gr/m²
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Paturin 19	Paturin -4	Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 3
Paturin -1	Paturin 0	Paturin 0		Paturin 14
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 21
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 30

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	40 gr/m²
Chénopode 37	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Paturin 37	Paturin -4	Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0
Matricaire 37	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Ray-grass 100	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 32
Paturin -1	Paturin 0	Paturin 0		Paturin 33
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 32
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 95

Année 4 - Aucune

Date de semis

Oct-d3

Chénopode	2
Paturin	15
Matricaire	20
Ray-grass	31

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Très faible

Chénopode	0
Paturin	0
Matricaire	0
Ray-grass	0

Interculture

Date des faux semis :
Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Chénopode	0
Paturin	0
Matricaire	0
Ray-grass	0

Date de labour

Pas de labour

Chénopode	0
Paturin	0
Matricaire	0
Ray-grass	0

Densité de semis

300 gr/m²

Chénopode	0
Paturin	0
Matricaire	0
Ray-grass	0

Entre rangs

15 cm

Chénopode	0
Paturin	0
Matricaire	0
Ray-grass	0

Variété

Non couvrante

Chénopode	0
Paturin	0
Matricaire	0
Ray-grass	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Chénopode	0
Paturin	0
Matricaire	0
Ray-grass	0

Désherbage chimique

Score annuel

Chénopode	2
Paturin	15
Matricaire	20
Ray-grass	31