

Exploitation : Non renseigné
 Parcelle : Formation rotation bio
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	28
Mercuriale	30
Mercuriale	30
Vulpin	0



Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie	Pas de labour	375 gr/m ²	
Chénopode 6 Mercuriale 9 Mercuriale 9 Vulpin 14	Chénopode -6 Mercuriale -6 Mercuriale -6 Vulpin -6	Chénopode 0 Mercuriale 0 Mercuriale 0 Vulpin 0	Chénopode 0 Mercuriale 0 Mercuriale 0 Vulpin 0	Chénopode -2 Mercuriale -2 Mercuriale -2 Vulpin -2	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
17 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mar-d2		Chénopode 0 Mercuriale 0 Mercuriale 0 Vulpin 2	
Chénopode 0 Mercuriale 0 Mercuriale 0 Vulpin 0	Chénopode -1 Mercuriale -1 Mercuriale -1 Vulpin -1	Chénopode -7 Mercuriale -9 Mercuriale -9 Vulpin -3			

Année 2 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode 0 Mercuriale 0 Mercuriale 0 Vulpin 0	Oct-d1	350 gr/m ² Chénopode 0 Mercuriale 0 Mercuriale 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mar-d2 Herse étrille : Avr-d2 Avr-d1 Chénopode -2 Mercuriale -2 Mercuriale -2 Vulpin -2		
Chénopode 0 Mercuriale 0 Mercuriale 0 Vulpin 0	Chénopode -2 Mercuriale -2 Mercuriale -2 Vulpin -2	Chénopode -9 Mercuriale -9 Mercuriale -9 Vulpin -5		Chénopode 0 Mercuriale 0 Mercuriale 0 Vulpin 0

Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Avr-d3 Avr-d1 Date de semis du couvert : Avr-d3 Date de destruction : Déc-d1 Chénopode 0 Mercuriale 0 Mercuriale 0 Vulpin 0	Déc-d1	11 gr/m ² Chénopode 0 Mercuriale 0 Mercuriale 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
80 cm	Non couvrante	Bineuse : Jul-d2 Jun-d3 Houe rotative : Mai-d2 Herse étrille : Jul-d2 Jun-d3 Jun-d2 Chénopode 0 Mercuriale 0 Mercuriale 0 Vulpin 0		
Chénopode 52 Mercuriale 108 Mercuriale 108 Vulpin 4	Chénopode 0 Mercuriale 0 Mercuriale 0 Vulpin 0	Chénopode -6 Mercuriale -11 Mercuriale -11 Vulpin -3		Chénopode 39 Mercuriale 75 Mercuriale 75 Vulpin 0
Chénopode 0 Mercuriale 0 Mercuriale 0 Vulpin 0	Chénopode 0 Mercuriale 0 Mercuriale 0 Vulpin 0	Chénopode -4 Mercuriale -18 Mercuriale -18 Vulpin -1		

Année 4 - Féverole d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Triticale Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie	Oct-d3	45 gr/m ²
Chénopode 0	Chénopode -10	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode 0
Mercuriale 3	Mercuriale -10	Mercuriale 0	Mercuriale -5	Mercuriale 0
Mercuriale 3	Mercuriale -10	Mercuriale 0	Mercuriale -5	Mercuriale 0
Vulpin 4	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin -14	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 0
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Aoû-d3 Aoû-d2	Pas de labour	375 gr/m ²
Chénopode 6	Chénopode -6	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0
Mercuriale 3	Mercuriale -6	Mercuriale 0	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Mercuriale 3	Mercuriale -6	Mercuriale 0	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Vulpin 8	Vulpin -6	Vulpin -4	Vulpin -2	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mar-d2		
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode -9		Chénopode 0
Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale -9		Mercuriale 0
Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale -9		Mercuriale 0
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -5		Vulpin 0

Année 6 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3 Chénopode 57 Mercuriale 105 Mercuriale 105 Vulpin 15	Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0 Mercuriale 0 Mercuriale 0 Vulpin 0	Date des faux semis : Avr-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode -3 Mercuriale -3 Mercuriale -3 Vulpin -2	Déc-d1 Chénopode -2 Mercuriale -4 Mercuriale -4 Vulpin -9	Non défini Chénopode 0 Mercuriale 0 Mercuriale 0 Vulpin 0
Entre rangs 75 cm Chénopode 0 Mercuriale 0 Mercuriale 0 Vulpin 0	Variété Non couvrante Chénopode 0 Mercuriale 0 Mercuriale 0 Vulpin 0	Désherbage mécanique Bineuse : Mai-d3 Mai-d2 Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille : Mai-d2 Mai-d1 Chénopode -14 Mercuriale -56 Mercuriale -56 Vulpin -3	Désherbage chimique	Score annuel Chénopode 38 Mercuriale 42 Mercuriale 42 Vulpin 1